

Roxb. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:247. 1887. pro syn.; Rehd. Man. Cult. Trees. Shrub. ed. 2. 446. 1940.

攀援小灌木，枝条圆柱形，紫褐色；小枝细弱，无毛；散生钩状皮刺和稀疏腺毛。小叶3，稀5，连叶柄长4—11厘米；小叶片卵状披针形或长圆披针形，长2—6厘米，宽0.8—2厘米，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有紧贴细锐锯齿，上面中脉下陷，下面苍白色，中脉突起，两面无毛；叶柄无毛，有散生皮刺和稀疏腺毛；托叶狭，极大部分贴生于叶柄，仅顶端分离，离生部分披针形，边缘有带腺锯齿。花单生或成伞房花序，稀有伞房圆锥花序；花直径2—2.5厘米，花梗长1—3.5厘米，无毛，有稀疏的腺毛；萼片披针形，先端渐尖，全缘，外面无毛，内面有短柔毛，边缘有稀疏腺毛，花后反折；花瓣粉红色，倒卵形，先端微凹，基部楔形；花柱结合成束，伸出，有柔毛，比雄蕊稍长。果实卵球形，直径约7毫米，紫褐色，无毛。花期3—5月，果期6—8月。

产福建。多生于山坡、荒地、路旁、河边等处。海拔400—1000米。

本种有重瓣变型，花淡粉红色，点缀枝头可供观赏，华东庭园有栽培。攀援藤本常具3片卵状披针形小叶，在合柱组中较易识别。

系7.全缘托叶系——Ser. **Brunonianae** Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):5. 1981.

本系有下列11种。

65. **复伞房蔷薇**(秦岭植物志) 勃朗蔷薇(经济植物手册)，万朵刺、倒钩刺、白刺玫(陕西) 图版68:5—6

Rosa brunonii Lindl. Ros. Monogr. 120. t. 14. 1820; Hook. in Curtis's Bot. Mag. **69**: t. 4030. 1843; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:306. 1915; Byhouwer in Journ. Arn. Arb. **10**:87. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:525. 1933; Kitamura in Funa & Fl. Nepal Himal. **1**:156. 1952—53; Hara et Ohashi Fl. E. Himal. 127. 1966, et **2**:55. 1971; Hara in Enum. Flow. Pl. Nepal **2**:143. 1979 ——— *R. moschata* var. *nepalensis* Lindl. in Bot. Reg. **10**: t. 829. 1824; Willmott, Gen. Ros. **1**:37. t. 1911. ——— *R. pubescens* Roxb. Fl. Ind. ed. 2(2). 514. 1832. ——— *R. clavigera* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **13**:338. 1914, et Cat. Pl. Yunnan 234. 1917 ——— *R. moschata* auct. non Mill. 1874; Brandis, For. Fl. Brit. Ind. 201. 1874; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:367. 1878.

攀援灌木，高4—6米；小枝圆柱形，幼时有柔毛，以后脱落减少并有短而弯曲的皮刺。小叶通常7，近花序小叶常为5或3，连叶柄长6—9厘米；小叶片长圆形或长圆披针形，长3—5厘米，宽1—1.5厘米，先端渐尖或急尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有锯齿，上面微被柔毛，稀无毛，下面密被柔毛；小叶柄和叶轴密被柔毛和散生钩状小皮刺；托叶大部贴生于叶柄，离生部分披针形，先端渐尖，边缘有腺，两面均被毛。花多朵排成复伞房状花序；花梗长2.8—3.5厘米，被柔毛和稀疏腺毛；花直径3—5厘米；萼筒倒卵形，外被柔毛；萼片

披针形,先端渐尖;常有1—2对裂片,内外两面均被柔毛;花瓣白色,宽倒卵形;花柱结合成柱,伸出,比雄蕊稍长,外被柔毛。果卵形,直径约1厘米,紫褐色,有光泽,无毛,成熟后萼片脱落。花期6月,果期7—11月。

产西藏、云南。多生于林下或河谷林缘灌丛中,海拔2600—2750米。

本种与广布南欧、北非和西亚的麝香蔷薇 *R. moschata* Herrm. 为近缘种,惟后者小叶片常5—7,椭圆卵形至长圆卵形,上面无色,下面除中肋有时被柔毛外,其余部分无毛,叶柄和叶轴也近于无毛,花常7朵成伞房花序是其异点。

66. 绣球蔷薇(中国植物学杂志)

Rosa glomerata Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:309. 1915; Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. **9**:25. 1933; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:525. 1933.

铺散灌木,有长匍枝,圆柱形,无毛,有时小枝有柔毛;皮刺散生基部膨大向下弯曲。小叶5—7,稀3或9,连叶柄长10—15厘米;小叶片长圆形或长圆倒卵形,长4—7厘米,宽1.8—3厘米,先端渐尖或短渐尖,基部圆形,稀近心形,稍偏斜,边缘有细锐锯齿,上面深绿色,有显明褶皱,下面淡绿色至绿灰色,叶脉显明突起,密被长柔毛;叶柄有小钩状皮刺和密生柔毛;托叶长2—3厘米,膜质,大部贴生于叶柄,离生部分耳状,全缘,有腺毛。伞房花序,密集多花,直径4—10厘米;总花梗长2—4厘米,花梗长1—1.5厘米,总花梗、花梗和萼筒密被灰色柔毛和稀疏腺毛;花直径1.5—2厘米;萼片卵状披针形,先端渐尖,全缘,内面密被柔毛,外面有柔毛和稀疏腺毛;花瓣宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,外被绢毛;花柱结合成束,伸出,比雄蕊稍长,密被柔毛。果实近球形,直径8—10毫米,桔红色,有光泽,幼时有稀疏柔毛和腺毛,以后脱落;果梗有稀疏柔毛和腺毛;萼片最后脱落。花期7月,果期8—10月。

产湖北、四川、云南、贵州等省。生山坡林缘,灌木丛中,海拔1300—3000米。模式标本采自四川康定。


67. 悬钩子蔷薇(秦岭植物志)

Rosa rubus Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. **55**:55. 1908; Willmott, Gen. Ros. **2**:507. t. 1914; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 354. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:312. 1932, et **17**:338. 1936; 秦岭植物志 **1**(2): 573. 图 475. 1974. ——*R. rubus* Lévl. et Vant. var. *yunnanensis* Lévl. in Bull. Soc. Bot. Fr. **55**:55. 1908, et Cat. Pl. Yunnan. 235. 1917. ——*R. moschata* var. *hupehensis* Pampanin. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **17**:295. 1910. ——*R. ernestii* Stapf ex Bean, Trees Shrubs Brit. Isl. **3**:349. 1933. ——*R. henryi* Bouleng. var. *puberula* (Hand.-Mazz.) Metc. in Journ. Arn. Arb. **21**:111. 1949.

67a. 悬钩子蔷薇(原变型)

R. rubus Lévl. et Vant. f. *rubus*

匍匐灌木,高可达5—6米;小枝圆柱形,通常被柔毛,幼时较密,老时脱落;皮刺短粗、



1—3.粉团蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. var. *cathayensis* Rehd. et Wils.: 1.花枝, 2.花纵剖面, 3.果实。4.银粉蔷薇 *Rosa anemoniflora* Fort.: 花枝。5—6.复伞房蔷薇 *Rosa brunonii* Lindl.: 5.花枝, 6.果实(王金凤绘)