

披针形,先端渐尖;常有1—2对裂片,内外两面均被柔毛;花瓣白色,宽倒卵形;花柱结合成柱,伸出,比雄蕊稍长,外被柔毛。果卵形,直径约1厘米,紫褐色,有光泽,无毛,成熟后萼片脱落。花期6月,果期7—11月。

产西藏、云南。多生于林下或河谷林缘灌丛中,海拔2600—2750米。

本种与广布南欧、北非和西亚的麝香蔷薇 *R. moschata* Herrm. 为近缘种,惟后者小叶片常5—7,椭圆卵形至长圆卵形,上面无色,下面除中肋有时被柔毛外,其余部分无毛,叶柄和叶轴也近于无毛,花常7朵成伞房花序是其异点。

66. 绣球蔷薇(中国植物学杂志)

Rosa glomerata Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:309. 1915; Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. **9**:25. 1933; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:525. 1933.

铺散灌木,有长匍枝,圆柱形,无毛,有时小枝有柔毛;皮刺散生基部膨大向下弯曲。小叶5—7,稀3或9,连叶柄长10—15厘米;小叶片长圆形或长圆倒卵形,长4—7厘米,宽1.8—3厘米,先端渐尖或短渐尖,基部圆形,稀近心形,稍偏斜,边缘有细锐锯齿,上面深绿色,有显明褶皱,下面淡绿色至绿灰色,叶脉显明突起,密被长柔毛;叶柄有小钩状皮刺和密生柔毛;托叶长2—3厘米,膜质,大部贴生于叶柄,离生部分耳状,全缘,有腺毛。伞房花序,密集多花,直径4—10厘米;总花梗长2—4厘米,花梗长1—1.5厘米,总花梗、花梗和萼筒密被灰色柔毛和稀疏腺毛;花直径1.5—2厘米;萼片卵状披针形,先端渐尖,全缘,内面密被柔毛,外面有柔毛和稀疏腺毛;花瓣宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,外被绢毛;花柱结合成束,伸出,比雄蕊稍长,密被柔毛。果实近球形,直径8—10毫米,桔红色,有光泽,幼时有稀疏柔毛和腺毛,以后脱落;果梗有稀疏柔毛和腺毛;萼片最后脱落。花期7月,果期8—10月。

产湖北、四川、云南、贵州等省。生山坡林缘,灌木丛中,海拔1300—3000米。模式标本采自四川康定。

67. 悬钩子蔷薇(秦岭植物志)

Rosa rubus Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. **55**:55. 1908; Willmott, Gen. Ros. **2**:507. t. 1914; Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 354. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:312. 1932, et **17**:338. 1936; 秦岭植物志 **1**(2): 573. 图 475. 1974. ——*R. rubus* Lévl. et Vant. var. *yunnanensis* Lévl. in Bull. Soc. Bot. Fr. **55**:55. 1908, et Cat. Pl. Yunnan. 235. 1917. ——*R. moschata* var. *hupehensis* Pampanin. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **17**:295. 1910. ——*R. ernestii* Stapf ex Bean, Trees Shrubs Brit. Isl. **3**:349. 1933. ——*R. henryi* Bouleng. var. *puberula* (Hand.-Mazz.) Metc. in Journ. Arn. Arb. **21**:111. 1949.

67a. 悬钩子蔷薇(原变型)

R. rubus Lévl. et Vant. f. *rubus*

匍匐灌木,高可达5—6米;小枝圆柱形,通常被柔毛,幼时较密,老时脱落;皮刺短粗、