

弯曲。小叶通常5，近花序偶有3枚，连叶柄长8—15厘米；小叶片卵状椭圆形、倒卵形或椭圆形，长3—6(—9)厘米，宽2—4.5厘米，先端尾尖、急尖或渐尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有尖锐锯齿，向基部浅而稀，上面深绿色，通常无毛或偶有柔毛，下面密被柔毛或有稀疏柔毛；小叶柄和叶轴有柔毛和散生的小沟状皮刺；托叶大部贴生于叶柄，离生部分披针形，先端渐尖，全缘常带腺体，有毛。花10—25朵，排成圆锥状伞房花序；花梗长1.5—2厘米，总花梗和花梗均被柔毛和稀疏腺毛，花直径2.5—3厘米；萼筒球形至倒卵球形，外被柔毛和腺毛；萼片披针形，先端长渐尖，通常全缘，两面均密被柔毛；花瓣白色，倒卵形，先端微凹，基部宽楔形，花柱结合成柱，比雄蕊稍长，外被柔毛。果近球形，直径8—10毫米，猩红色至紫褐色，有光泽，花后萼片反折，以后脱落。花期4—6月，果期7—9月。

产甘肃、陕西、湖北、四川、云南、贵州、广西、广东、江西、福建、浙江、等省区。多生山坡、路旁、草地或灌丛中，海拔500—1300米。模式标本采自贵州平阳。

本种广泛分布华西、华东、华南各省山区，以其小枝和叶片下面密被柔毛，和多数白色芳香花朵和球形红色果实，易于区别。

根皮含鞣质11—19%，可提制栲胶，鲜花可提制芳香油及浸膏。

陈嵘《中国树木分类学》450页，*Rosa rubus* Lévl. et Vaunt. 茶藨花中名，引自花镜一书，查原书有文字记载和插图，文称茶藨花，一名佛见笑，又有独步青，百宜枝，雪梅墩数名。蔓生多刺，绿叶青条，须承之以架则繁。花有三种：大朵千瓣，色白而香，每一颖著三叶如品字。青附红萼及大放，则纯白。有密色者，不及黄蔷薇，枝梗多刺而香。又有红者，俗呼番茶藨，亦不香。附图形为重瓣花，有小叶3片。从图与文字看，均似香水月季 *R. odorata* (Andr.) Sweet 而非悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant.。因此本种不采用茶藨花之名。

67b. 腺叶悬钩子蔷薇 (变型)

***R. rubus* Lévl. et Vant. f. *glandulifera* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(2):15. 1981.**

本变型主要特征小叶下面密被腺体。

产广西。生山地，海拔1000米。

68. 卵果蔷薇(中国高等植物图鉴) 巴东蔷薇(秦岭植物志)、牛黄树刺(湖北)，野牡丹刺(陕西)

***Rosa helenae* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:310 1915; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:140. 1968 et in Fl. Thailand 2(1):64. 1970; 秦岭植物志 1(2): 574. 1974. — *R. floribunda* Baker in Willmott, Gen. Ros. 2:513. 1914.**

铺散灌木，有长匍枝；枝条粗壮，紫褐色，当年小枝红褐色，无毛；皮刺短粗，基部膨大，稍弯曲，带黄色。小叶(5—)7—9，连叶柄长8—17厘米，小叶片长圆卵形或卵状披针形，长2.5—4.5厘米，宽1—2.5厘米，先端急尖或短渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有紧贴锐

锯齿,上面无毛,深绿色,下面有毛,沿叶脉较密,淡绿色,叶脉突起;叶柄有柔毛和小皮刺。托叶长1.5—2.5厘米,大部贴生于叶柄,仅顶端离生,离生部分耳状,边缘有腺毛。顶生伞房花序,部分密集近伞形,直径6—15厘米;苞片膜质,狭披针形,很早脱落;花梗长1.5—2厘米,总花梗和花梗均密被柔毛和腺毛;萼筒卵球形、椭圆形或倒卵球形,外被柔毛和腺毛;萼片卵状披针形,先端渐尖,常有裂片,外面有长柔毛和腺毛,内面密被长柔毛;花瓣倒卵形,白色,有香味,长约1.5厘米,先端微凹,基部楔形;花柱结合成束,伸出,密被长柔毛,约与雄蕊等长。果实卵球形、椭圆形或倒卵球形,长1—1.5厘米,直径8—10毫米,深者红色,有光泽,果梗长约2厘米,近无毛,密被腺毛;萼片花后反折,以后脱落。花期5—7月,果期9—10月。

产湖北、陕西、甘肃、四川、云南、贵州等省。多生于山坡、沟边和灌丛中,海拔1000—1160米。模式标本采自湖北巴东。

69. 长尖叶蔷薇(经济植物手册) 粉棠果(云南中草药续集)

Rosa longicuspis Bertol. in Mem. Acad. Sci. Bologn. **11**:101. t. 13. (Misc. Bot. **21**: 15.) 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:367. 1878; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 235. 1917; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:314. 1932, et **17**: 339. 1936. — *R. moschata* var. *yunnanensis* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. **25**(2):8. 1886; Franch. Pl. Delav. 218. 1890. — *R. willmottiana* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:299. 1912; Willmott, Gen. Ros. **1**:73. 1911. — *R. charbonneaui* Lévl. l. c. **13**:338. 1914. — *R. lucens* Paul & Son, Rose Cat. **1915**—**16**:15. 1915. — *R. yunnanensis* (Crép.) Bouleng. Bull. Jard. Bot. Bruxell. **9**:235. 1933.

69a. 长尖叶蔷薇(原变种)

R. longicuspis Bertol. var. *longicuspis*

攀援灌木,高1.5—3米;枝弓曲,常有短粗钩状皮刺。小叶革质,7—9,近花序的小叶常为5,连叶柄长7—14厘米;小叶片卵形、椭圆形或卵状长圆形,稀倒卵状长圆形,长3—7(—11)厘米,宽1—3.5(—5)厘米,先端渐尖或长渐尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有尖锐锯齿,两面无毛,上面有光泽,下面中脉突起;小叶柄和叶轴均无毛,有散生小钩状皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,无毛,常有腺毛。花多数,排成伞房状,花梗长1.5—3.5厘米,有稀疏柔毛和较密腺毛;花直径3—4(—5)厘米;萼筒卵球形至倒卵球形,外被稀疏柔毛;萼片披针形,先端长渐尖,全缘或有羽裂片,内外两面均被柔毛,外面并有腺毛;花瓣白色,宽倒卵形,先端凹凸不平,基部宽楔形,外面有平铺绢毛;花柱结合成柱,有毛,比雄蕊稍长。果实倒卵球形。直径1—1.2厘米,暗红色,萼片反折,成熟时萼片脱落,花柱宿存。花期5—7月,果期7—11月。

产云南、四川、贵州。生丛林中,海拔600—2100米。印度北部有分布。

本种为高大藤本,广泛分布在我国西南各省山区,叶片大小变异相差很大,有些地区常绿不凋;花序从4—5朵多至10余朵,但枝叶均光滑无毛,叶片光亮革质,有长尖头,花