

锯齿,上面无毛,深绿色,下面有毛,沿叶脉较密,淡绿色,叶脉突起;叶柄有柔毛和小皮刺。托叶长 1.5—2.5 厘米,大部贴生于叶柄,仅顶端离生,离生部分耳状,边缘有腺毛。顶生伞房花序,部分密集近伞形,直径 6—15 厘米;苞片膜质,狭披针形,很早脱落;花梗长 1.5—2 厘米,总花梗和花梗均密被柔毛和腺毛;萼筒卵球形、椭圆形或倒卵球形,外被柔毛和腺毛;萼片卵状披针形,先端渐尖,常有裂片,外面有长柔毛和腺毛,内面密被长柔毛;花瓣倒卵形,白色,有香味,长约 1.5 厘米,先端微凹,基部楔形;花柱结合成束,伸出,密被长柔毛,约与雄蕊等长。果实卵球形、椭圆形或倒卵球形,长 1—1.5 厘米,直径 8—10 毫米,深者红色,有光泽,果梗长约 2 厘米,近无毛,密被腺毛;萼片花后反折,以后脱落。花期 5—7 月,果期 9—10 月。

产湖北、陕西、甘肃、四川、云南、贵州等省。多生于山坡、沟边和灌丛中,海拔 1000—1160 米。模式标本采自湖北巴东。

69. 长尖叶蔷薇(经济植物手册) 粉棠果(云南中草药续集)

*Rosa longicuspis* Bertol. in Mem. Acad. Sci. Bologn. **11**:101. t. 13. (Misc. Bot. **21**: 15.) 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:367. 1878; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 235. 1917; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:314. 1932, et **17**: 339. 1936. — *R. moschata* var. *yunnanensis* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. **25**(2):8. 1886; Franch. Pl. Delav. 218. 1890. — *R. willmottiana* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:299. 1912; Willmott, Gen. Ros. **1**:73. 1911. — *R. charbonneaui* Lévl. l. c. **13**:338. 1914. — *R. lucens* Paul & Son, Rose Cat. **1915**—**16**:15. 1915. — *R. yunnanensis* (Crép.) Bouleng. Bull. Jard. Bot. Bruxell. **9**:235. 1933.

69a. 长尖叶蔷薇(原变种)

*R. longicuspis* Bertol. var. *longicuspis*

攀援灌木,高 1.5—3 米;枝弓曲,常有短粗钩状皮刺。小叶革质,7—9,近花序的小叶常为 5,连叶柄长 7—14 厘米;小叶片卵形、椭圆形或卵状长圆形,稀倒卵状长圆形,长 3—7(—11) 厘米,宽 1—3.5(—5) 厘米,先端渐尖或长渐尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有尖锐锯齿,两面无毛,上面有光泽,下面中脉突起;小叶柄和叶轴均无毛,有散生小钩状皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,无毛,常有腺毛。花多数,排成伞房状,花梗长 1.5—3.5 厘米,有稀疏柔毛和较密腺毛;花直径 3—4(—5) 厘米;萼筒卵球形至倒卵球形,外被稀疏柔毛;萼片披针形,先端长渐尖,全缘或有羽裂片,内外两面均被柔毛,外面并有腺毛;花瓣白色,宽倒卵形,先端凹凸不平,基部宽楔形,外面有平铺绢毛;花柱结合成柱,有毛,比雄蕊稍长。果实倒卵球形。直径 1—1.2 厘米,暗红色,萼片反折,成熟时萼片脱落,花柱宿存。花期 5—7 月,果期 7—11 月。

产云南、四川、贵州。生丛林中,海拔 600—2100 米。印度北部有分布。

本种为高大藤本,广泛分布在我国西南各省山区,叶片大小变异相差很大,有些地区常绿不凋;花序从 4—5 朵多至 10 余朵,但枝叶均光滑无毛,叶片光亮革质,有长尖头,花