

瓣外被絹毛,果形较大是其特征。

69b. 多花长尖叶薔薇(变种)

R. longicuspis Bertol. var. **sinowilsonii** (Hemsl.) Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4): 15. 1981. — *R. sinowilsoni* Hemsl. in Kew Bull. **1906**:158. 1906; Willmott, Gen. Ros. **1**:73. 1911.

本变种与原变种的异点在其叶形较大,花朵较多,小叶片常5片,稀7,边缘为单锯齿或偶有重锯齿,上面微皱,下面无毛或微有短柔毛;复伞房花序,有花多至30余朵,易于区别。

产四川、贵州、云南。

70. 毛萼薔薇

Rosa lasiosepala Metc. in Journ. Arn. Arb. **21**:274. 1940.

攀援灌木,高约10米;小枝粗壮,弓形,有稜,无毛,有短粗钩状散生皮刺。小叶革质,通常5,近花序小叶常为3,极稀为7;连叶柄长17—25厘米;小叶片椭圆形,稀卵状长圆形,长7—12厘米,宽3—6厘米,先端渐尖或短尾尖,基部圆形,边缘有尖锐锯齿,两面无毛,上面中脉明显下陷,下面中脉和侧脉显著突起;小叶柄和叶轴均无毛;托叶大部贴生于叶柄,离生部分卵状披针形,边缘有毛和腺毛,以后脱落。花多数成复伞房状;花梗长2.5—4厘米,总花梗和花梗均密被短柔毛;花直径3—4厘米;萼片披针形,长1.5—2厘米,比萼筒长近1倍,反折,萼筒和萼片内外两面均密被柔毛;花瓣白色,倒卵形,先端凹凸不整,基部楔形,外面有稀疏柔毛;雄蕊多数,花柱结合成柱,密被白色柔毛。果近球形或卵球形,直径1.8—2.3厘米,紫褐色,有稀疏柔毛,萼片最后脱落。

产广西。生山谷或山坡疏密林中以及路旁、水边等处,海拔900—1800米。模式标本采自广西罗城。

71. 腺梗薔薇(经济植物手册) 白桂花(四川宝兴)

Rosa filipes Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:311. 1915; Stapf in Curtis's Bot. Mag. **147**: t. 8894. 1938.

灌木,高3—5米,有长匍枝;小枝无毛,有粗短弯曲皮刺。小叶5—7,稀3或9;连叶柄长8—14厘米;小叶片长圆卵形或披针形,稀倒卵形,长4—7厘米,宽1.5—3厘米,先端渐尖,基部近圆形或宽楔形,有时稍偏斜,边缘单锯齿,稀为不明显重锯齿,上面深绿色,无毛,下面近无毛或沿脉有短柔毛和腺毛,中脉和侧脉明显突起;小叶柄和叶轴有稀疏柔毛和腺毛,散生钩状小皮刺;托叶狭,大部贴生于叶柄,离生部分披针形,先端渐尖,全缘,而有极疏腺毛。花多数,25—35朵,成复伞房状或圆锥状花序;直径可达15厘米;花梗细,长2—3厘米,总花梗和花梗无毛,有稀疏腺毛;花直径2—2.5厘米;萼筒卵球形,无毛而有腺毛;萼片卵状披针形,先端渐尖,全缘,外面有疏柔毛和腺毛,内面密被柔毛;花瓣白色,倒卵形,花柱结合成柱,伸出,被柔毛。果近球形,直径约8毫米,猩红色,萼片反折,最后脱落,花柱常部分宿存。花期6—7月,果期7—11月。