

1945. — *R. gentiliana* auct. non Lévl. et Vant. 1908; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:312. 1915; Willmott, Gen. Ros. 2:513. t. 1914. — *R. floribunda* auct. non Steven ex Besser 1815; Baker in Willmott, Gen. Ros. 2:513. 1914.

灌木,高3—5米,有长匍枝;小枝有短扁、弯曲皮刺或无刺。小叶通常5,近花序小叶片常为3,连叶柄长9—14厘米;小叶片长圆形、卵形、椭圆形或椭圆状卵形,长3.5—9厘米,宽1.5—5厘米,先端长渐尖或尾尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有锐锯齿,两面均无毛,下面中脉突起;小叶柄和叶轴无毛,有散生小皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,先端渐尖,全缘,无毛,或有稀疏腺毛。花5—15朵,成伞形伞房状花序;花直径3—4厘米;花梗和萼筒无毛,有时具腺毛,萼片披针形,先端渐尖,全缘,有少数裂片,外面近无毛而有稀疏腺点,内面有长柔毛;花瓣白色,宽倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;花柱结合成柱,被柔毛,比雄蕊稍长。果近球形,直径8—10毫米,成熟后褐红色,有光泽,果梗有稀疏腺点;萼片脱落。

产陕西、河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、广西、湖北、湖南、四川、云南、贵州等省区。生山谷、林边、田边或灌丛中,海拔1700—2000米。

与本种极为近似的种为我国台湾之山蔷薇 *Rosa sambucina* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 31:130. 1917; Li, Woody Fl. Taiwan 299. 1963; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:102. 1977.

攀援灌木;小枝无毛,有短粗皮刺;小叶多数5,稀3,小叶片长圆形至长圆倒卵形,长5—8厘米,宽2—3厘米,先端渐尖或急尖,基部圆钝,两面近无毛,边有不规则锯齿;叶轴无毛,有稀疏小皮刺;托叶三分之二贴生于叶柄,先端披针形,两面无毛。花4至多朵成顶生伞房花序;花梗和总花梗无毛或稍有腺毛;萼片全缘,外面密被绒毛;花瓣白色,先端微凹,长1—1.5厘米;花柱结合成束,无毛。

从以上记载比较,山蔷薇与软条七蔷薇,除萼筒萼片外面密被绒毛或柔毛外,基本相似,两者可能为同物异名。按照国际植物命名法规优先律的决定,应采用 *R. sambucina* Koidz. 一名,由于缺乏资料,留待以后确定。

74. 重齿蔷薇

Rosa duplicata Yü et Ku, 植物分类学报 18(4): 501. 1980.

小灌木,高1.5—2米,老枝粗壮,灰褐色;小枝细弱,弯曲,紫褐色,无毛,散生浅黄色皮孔。小叶3—5,连叶柄长2—2.5厘米;小叶片倒卵形或椭圆形,长8—15毫米,宽5—8毫米,顶端圆钝或截形,基部近圆形或宽楔形,边缘有重锯齿,齿尖常有腺体,两面无毛,下面有腺体;小叶柄和叶轴有小皮刺和腺毛;托叶大部贴生于叶柄。花单生或2—3朵集生;花梗长5—10毫米,有腺毛,无毛;花直径约1厘米;萼筒近球形,萼片卵状披针形,顶端短尾尖,全缘,萼筒和萼片外面有稀疏柔毛和腺毛,内面密被短柔毛;花瓣淡黄色或白色,倒卵形;雄蕊多数;花柱结合成柱,有稀疏柔毛或近无毛,比雄蕊稍长;心皮多数。果实直径约5毫米,紫红色,果梗有腺毛,萼片最后脱落。

产我国西藏。多生于田埂路旁,海拔 2400—2600 米。

本种近似于川滇蔷薇 *R. soulieana* Crép., 但小叶边缘为重锯齿,下面有腺体;花单生,稀 2—3 朵集生,两者易于区别。

75. 维西蔷薇

Rosa weisiensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):16. 1981.

攀援小灌木;小枝圆柱形,紫褐色,无毛;当年生小枝有腺毛和稀疏柔毛;皮刺短、扁、散生。小叶 3—5,连叶柄长 4—5.5 厘米;小叶片卵形,椭圆形稀长圆形,长 1.2—2.5 厘米,宽 4—14 毫米,先端急尖或短渐尖,基部近圆形,上面深绿色,无毛,下面颜色较浅,有腺毛和稀疏柔毛,边缘有重锯齿,幼时齿尖常带腺体;小叶柄和叶轴有散生腺毛和柔毛;托叶膜质,大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘和下面有腺。花 5—10 朵,成伞房状排列,花梗长 8—12 毫米,密被腺毛和散生柔毛;花直径约 1.5 厘米;萼片披针形,全缘,先端长渐尖,花后反折,萼筒和萼片外面被腺毛和稀疏柔毛,内面密被柔毛;花瓣白色,有香味,宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,约与萼片等长;雄蕊多数;花柱结合成柱,伸出,比雄蕊长约 1 倍,密被柔毛。果未见。

产云南。多生灌丛中,海拔 1850—2300 米。

本种与悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant. 近似,惟小叶和花朵均较小,叶片边缘有重锯齿,叶片下面被腺体,易于区别。

组 6. 木香组——Sect. *Banksianae* Lindl. Ros. Monogr. 39. 1820. p.p.; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 450. 1951. ——*Rosa* groupe *Banksienenses* Thory, Prodr. Monogr. Ros. 39. 1820. ——*Rosa* ser. *Aitoniana* Tratt. Ros. Monogr. 2:211. 1823. ——*Rosa* sect. *Banksiae* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 14:163. (Prim. Monogr. Ros. 367) 1875. nom. nud., et in Journ. Hort. Soc. Lond. 11:3. 1889.

本组 2 种,产我国。

木香组分种检索表

- 1. 伞房花序;萼片全缘..... 76. 木香花 *R. banksiae* Ait.
- 1. 复伞房花序;萼片有羽状裂片..... 77. 小果蔷薇 *R. cymosa* Tratt.

76. 木香花(花镜) 木香(群芳谱),七里香(四川)

Rosa banksiae Ait. Hort. Kew. ed 2. 3:258. 1811; Sims in Curtis's Bot. Mag. 45:t. 1954. 1818; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:316. 1915; 江苏南部种子植物手册 360. 1959; Vidal in Fl. Thailand 2(1):66. 1970; 秦岭植物志 1(2): 575. 1974; 中国高等植物图鉴 2: 252. 图 2234. 1972. ——*R. banksiae* Ait. var. *albo-plena* Rehd. in Bailey,