

产我国西藏。多生于田埂路旁,海拔 2400—2600 米。

本种近似于川滇蔷薇 *R. soulieana* Crép., 但小叶边缘为重锯齿,下面有腺体;花单生,稀 2—3 朵集生,两者易于区别。

75. 维西蔷薇

Rosa weisiensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):16. 1981.

攀援小灌木;小枝圆柱形,紫褐色,无毛;当年生小枝有腺毛和稀疏柔毛;皮刺短、扁、散生。小叶 3—5,连叶柄长 4—5.5 厘米;小叶片卵形,椭圆形稀长圆形,长 1.2—2.5 厘米,宽 4—14 毫米,先端急尖或短渐尖,基部近圆形,上面深绿色,无毛,下面颜色较浅,有腺毛和稀疏柔毛,边缘有重锯齿,幼时齿尖常带腺体;小叶柄和叶轴有散生腺毛和柔毛;托叶膜质,大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘和下面有腺。花 5—10 朵,成伞房状排列,花梗长 8—12 毫米,密被腺毛和散生柔毛;花直径约 1.5 厘米;萼片披针形,全缘,先端长渐尖,花后反折,萼筒和萼片外面被腺毛和稀疏柔毛,内面密被柔毛;花瓣白色,有香味,宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,约与萼片等长;雄蕊多数;花柱结合成柱,伸出,比雄蕊长约 1 倍,密被柔毛。果未见。

产云南。多生灌丛中,海拔 1850—2300 米。

本种与悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant. 近似,惟小叶和花朵均较小,叶片边缘有重锯齿,叶片下面被腺体,易于区别。

组 6. 木香组——Sect. *Banksianae* Lindl. Ros. Monogr. 39. 1820. p.p.; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 450. 1951. — *Rosa* groupe *Banksienenses* Thory, Prodr. Monogr. Ros. 39. 1820. — *Rosa* ser. *Aitoniana* Tratt. Ros. Monogr. 2:211. 1823. — *Rosa* sect. *Banksiae* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 14:163. (Prim. Monogr. Ros. 367) 1875. nom. nud., et in Journ. Hort. Soc. Lond. 11:3. 1889.

本组 2 种,产我国。

木香组分种检索表

- 1. 伞房花序;萼片全缘..... 76. 木香花 *R. banksiae* Ait.
- 1. 复伞房花序;萼片有羽状裂片..... 77. 小果蔷薇 *R. cymosa* Tratt.

76. 木香花(花镜) 木香(群芳谱),七里香(四川)

Rosa banksiae Ait. Hort. Kew. ed 2. 3:258. 1811; Sims in Curtis's Bot. Mag. 45:t. 1954. 1818; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:316. 1915; 江苏南部种子植物手册 360. 1959; Vidal in Fl. Thailand 2(1):66. 1970; 秦岭植物志 1(2): 575. 1974; 中国高等植物图鉴 2: 252. 图 2234. 1972. — *R. banksiae* Ait. var. *albo-plena* Rehd. in Bailey,