

产我国西藏。多生于田埂路旁,海拔 2400—2600 米。

本种近似于川滇蔷薇 *R. soulieana* Crép., 但小叶边缘为重锯齿,下面有腺体;花单生,稀 2—3 朵集生,两者易于区别。

75. 维西蔷薇

Rosa weisiensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):16. 1981.

攀援小灌木;小枝圆柱形,紫褐色,无毛;当年生小枝有腺毛和稀疏柔毛;皮刺短、扁、散生。小叶 3—5,连叶柄长 4—5.5 厘米;小叶片卵形,椭圆形稀长圆形,长 1.2—2.5 厘米,宽 4—14 毫米,先端急尖或短渐尖,基部近圆形,上面深绿色,无毛,下面颜色较浅,有腺毛和稀疏柔毛,边缘有重锯齿,幼时齿尖常带腺体;小叶柄和叶轴有散生腺毛和柔毛;托叶膜质,大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘和下面有腺。花 5—10 朵,成伞房状排列,花梗长 8—12 毫米,密被腺毛和散生柔毛;花直径约 1.5 厘米;萼片披针形,全缘,先端长渐尖,花后反折,萼筒和萼片外面被腺毛和稀疏柔毛,内面密被柔毛;花瓣白色,有香味,宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,约与萼片等长;雄蕊多数;花柱结合成柱,伸出,比雄蕊长约 1 倍,密被柔毛。果未见。

产云南。多生灌丛中,海拔 1850—2300 米。

本种与悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant. 近似,惟小叶和花朵均较小,叶片边缘有重锯齿,叶片下面被腺体,易于区别。

组 6. 木香组——Sect. *Banksianae* Lindl. Ros. Monogr. 39. 1820. p.p.; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 450. 1951. ——*Rosa* groupe *Banksienenses* Thory, Prodr. Monogr. Ros. 39. 1820. ——*Rosa* ser. *Aitoniana* Tratt. Ros. Monogr. 2:211. 1823. ——*Rosa* sect. *Banksiae* Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 14:163. (Prim. Monogr. Ros. 367) 1875. nom. nud., et in Journ. Hort. Soc. Lond. 11:3. 1889.

本组 2 种,产我国。

木香组分种检索表

- 1. 伞房花序;萼片全缘..... 76. 木香花 *R. banksiae* Ait.
- 1. 复伞房花序;萼片有羽状裂片..... 77. 小果蔷薇 *R. cymosa* Tratt.

76. 木香花(花镜) 木香(群芳谱),七里香(四川)

Rosa banksiae Ait. Hort. Kew. ed 2. 3:258. 1811; Sims in Curtis's Bot. Mag. 45:t. 1954. 1818; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:316. 1915; 江苏南部种子植物手册 360. 1959; Vidal in Fl. Thailand 2(1):66. 1970; 秦岭植物志 1(2): 575. 1974; 中国高等植物图鉴 2: 252. 图 2234. 1972. ——*R. banksiae* Ait. var. *albo-plena* Rehd. in Bailey,

Cycl. Am. Hort. 4:1552. 1902; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:316. 1915.

76a. 木香花(原变种)

R. banksiae Ait. var. **banksiae**

攀援小灌木,高可达6米;小枝圆柱形,无毛,有短小皮刺;老枝上的皮刺较大,坚硬,经栽培后有时枝条无刺。小叶3—5,稀7,连叶柄长4—6厘米;小叶片椭圆状卵形或长圆披针形,长2—5厘米,宽8—18毫米,先端急尖或稍钝,基部近圆形或宽楔形,边缘有紧贴细锯齿,上面无毛,深绿色,下面淡绿色,中脉突起,沿脉有柔毛;小叶柄和叶轴有稀疏柔毛和散生小皮刺;托叶线状披针形,膜质,离生,早落。花小形,多朵成伞形花序,花直径1.5—2.5厘米;花梗长2—3厘米,无毛;萼片卵形,先端长渐尖,全缘,萼筒和萼片外面均无毛,内面被白色柔毛;花瓣重瓣至半重瓣,白色,倒卵形,先端圆,基部楔形;心皮多数,花柱离生,密被柔毛,比雄蕊短很多。花期4—5月。

产四川、云南。生溪边、路旁或山坡灌丛中,海拔500—1300米。全国各地均有栽培。

花含芳香油,可供配制香精化妆品用。著名观赏植物,常栽培供攀援棚架之用。性不耐寒,在华北、东北只能作盆栽,冬季移入室内防冻。

木香花种下等级检索表

- 1. 花白色。
 - 2. 花重瓣至半重瓣..... 76a. 木香花 var. **banksiae**
 - 2. 花单瓣..... 76b. 单瓣白木香 var. **normalis** Regel
- 1. 花黄色。
 - 3. 花重瓣..... 76c. 黄木香花 f. **lutea** (Lindl.) Rehd.
 - 3. 花单瓣..... 76d. 单瓣黄木香 f. **lutescens** Voss.

76b. 单瓣白木香 七里香(陕西) 图版 67: 8—10

R. banksiae Ait. var. **normalis** Regel in Acta Hort. Petrop. 5:376. 1878; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:317. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:526. 1933; 秦岭植物志 1(2): 576. 图 476. 1974. — *R. banksiae* auct. non Ait.: Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 14:162. 1875.

花白色,单瓣,味香;果球形至卵球形,直径5—7毫米,红黄色至黑褐色,萼片脱落。此为木香花野生原始类型。

产河南、甘肃、陕西、湖北、四川、云南、贵州。生沟谷中,海拔500—1500米。

根皮含鞣质19%,可供制栲胶,又供药用,称红根,能活血、调经、消肿。

76c. 黄木香花

R. banksiae Ait. f. **lutea** (Lindl.) Rehd. in Bibliog. 316. 1949. — *R. banksiae* var. **lutea** Lindl. in Bot. Reg. 13:t. 1105. 1827. — *R. banksiae* var. **lutea-plena** Rehd.