

2:181. 1823. — *R. amygdalifolia* Ser. in DC. Prodr. 2:601. 1825. — *R. argyi* Lévl. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18:257. 1937. in obs. — *R. laevigata* var. *kaiscianensis* Pampanini in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17:294. 1910. — *R. sinica* auct. non L. 1789: Hook. in Curtis's Bot. Mag. 55: t. 2848. 1828.

78a. 金樱子(原变型) 图版 71: 1—3

R. laevigata* Michx. f. *laevigata

常绿攀援灌木, 高可达 5 米; 小枝粗壮, 散生扁弯皮刺, 无毛, 幼时被腺毛, 老时逐渐脱落减少。小叶革质, 通常 3, 稀 5, 连叶柄长 5—10 厘米; 小叶片椭圆状卵形、倒卵形或披针状卵形, 长 2—6 厘米, 宽 1.2—3.5 厘米, 先端急尖或圆钝, 稀尾状渐尖, 边缘有锐锯齿, 上面亮绿色, 无毛, 下面黄绿色, 幼时沿中肋有腺毛, 老时逐渐脱落无毛; 小叶柄和叶轴有皮刺和腺毛; 托叶离生或基部与叶柄合生, 披针形, 边缘有细齿, 齿尖有腺体, 早落。花单生于叶腋, 直径 5—7 厘米; 花梗长 1.8—2.5 厘米, 偶有 3 厘米者, 花梗和萼筒密被腺毛, 随果实成长变为针刺; 萼片卵状披针形, 先端呈叶状, 边缘羽状浅裂或全缘, 常有刺毛和腺毛, 内面密被柔毛, 比花瓣稍短; 花瓣白色, 宽倒卵形, 先端微凹; 雄蕊多数; 心皮多数, 花柱离生, 有毛, 比雄蕊短很多。果梨形、倒卵形, 稀近球形, 紫褐色, 外面密被刺毛, 果梗长约 3 厘米, 萼片宿存。花期 4—6 月, 果期 7—11 月。

产陕西、安徽、江西、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、广西、台湾、福建、四川、云南、贵州等省区。喜生于向阳的山野、田边、溪畔灌木丛中, 海拔 200—1600 米。

根皮含鞣质可制栲胶, 果实可熬糖及酿酒。根、叶、果均入药, 根有活血散瘀、祛风除湿、解毒收敛及杀虫等功效; 叶外用治疮疖, 烧烫伤; 果能止腹泻并对流感病毒有抑制作用。

78b. 重瓣金樱子(变型)

***R. laevigata* Michx. f. *sempilena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):17. 1981.**


本变种花为半重瓣, 直径 5—9 厘米。

产江西(浮梁)。生向阳山地。

组 8. 硕苞组 — Sect. Bracteatae Thory, Prodr. Monogr. Ros. 125. 1820; Lindl Ros. Monogr. 7. 1820. sp. nonnull. excl.; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 11:96. (Prim. Monogr. Ros. 212) 1872; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:337. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 450. 1951. — *Rosa* sect. *Chinenses* DC. ex Ser. Mus. Helv. Hist. Nat. 1:2. 1818. p. p. — *Rosa* ser. *Redouteana* Tratt. Ros. Monogr. 2:105. 1823. — *Rosa* ser. *Wendlandiana* Tratt. op. cit. 188. 1823.

本组 2 种, 产亚洲, 我国产 1 种。

79. 硕苞蔷薇 野毛栗, 糖钵(浙江)



1—3. 金樱子 *Rosa laevigata* Michx: 1. 花枝, 2. 果实, 3. 果纵剖面。 4—6. 单瓣缢丝花 *Rosa roxburghii* Tratt. f. *normalis* Rehd. et Wils.: 4. 花枝, 5. 果枝, 6. 果纵剖面。 7—9. 硕苞蔷薇 *Rosa bracteata* Wendl.: 7. 花枝, 8. 果枝, 9. 果纵剖面。(吴影桦绘)