

Ros. Monogr. 2:192. 1823. p. p. — *Platyrhodon* Decaisne ex Hurst in Verh. V. Internat. Kongr. Vererbungswiss. Berlin 1927:902. 1928. — *Rosa* subgen. *Platyrhodon* (Hurst) Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2. 451. 1940.

我国产以下 3 种。

小叶组分种检索表

1. 小叶两面无毛; 萼片羽状分裂, 萼筒和萼片外面密被针刺。
 2. 花单生或 2—3 朵集生; 花瓣淡红色或粉红色, 花直径 5—6 厘米 ... 80. 缙丝花 *R. roxburghii* Tratt.
 2. 花多朵成复伞房状; 花瓣白色, 花直径 2.5—3 厘米 ... 81. 贵州缙丝花 *R. kweichowensis* Yü et Ku
1. 小叶两面被毛; 萼片全缘, 萼筒和萼片外面无针刺, 花瓣红色, 花直径 8—9 厘米 ... 82. 中甸刺玫 *R. praelucens* Byhouwe

80. 缙丝花(植物名实图考) 刺藤(植物名实图考), 刺梨(贵州), 文光果

Rosa roxburghii Tratt. Ros. Monogr. 2:233. 1823; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:319. 1915; Hara et Ohashi in Fl. E. Himal. 2:55. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 254. 图 2237. 1972; 秦岭植物志 1(2): 576. 1974 — *R. microphylla* a. *glabra* Regel in Ros. Monogr. 38. 1877, et in Acta Hort. Petrop. 5:321. 1878. — *R. microphylla* auct. non Desfontaines: Roxb. apud Lindl. Ros. Monogr. 9:146. 1820; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 23:t. 3490. 1836; Willmott, Gen. Ros. 1:135. t. 1911.

82a. 缙丝花(原变型)

R. roxburghii Tratt. f. *roxburghii*

开展灌木, 高 1—2.5 米; 树皮灰褐色, 成片状剥落; 小枝圆柱形, 斜向上升, 有基部稍扁而成对皮刺。小叶 9—15, 连叶柄长 5—11 厘米, 小叶片椭圆形或长圆形, 稀倒卵形, 长 1—2 厘米, 宽 6—12 毫米, 先端急尖或圆钝, 基部宽楔形, 边缘有细锐锯齿, 两面无毛, 下面叶脉突起, 网脉明显, 叶轴和叶柄有散生小皮刺; 托叶大部贴生于叶柄, 离生部分呈钻形, 边缘有腺毛。花单生或 2—3 朵, 生于短枝顶端; 花直径 5—6 厘米; 花梗短; 小苞片 2—3 枚, 卵形, 边缘有腺毛; 萼片通常宽卵形, 先端渐尖, 有羽状裂片, 内面密被绒毛, 外面密被针刺; 花瓣重瓣至半重瓣, 淡红色或粉红色, 微香, 倒卵形, 外轮花瓣大, 内轮较小; 雄蕊多数着生在杯状萼筒边缘; 心皮多数, 着生在花托底部; 花柱离生, 被毛, 不外伸, 短于雄蕊。果扁球形, 直径 3—4 厘米, 绿红色, 外面密生针刺; 萼片宿存, 直立。花期 5—7 月, 果期 8—10 月。

产陕西、甘肃、江西、安徽、浙江、福建、湖南、湖北、四川、云南、贵州、西藏等省区, 均有野生或栽培。也见于日本。

果实味甜酸, 含大量维生素, 可供食用及药用, 还可作为熬糖酿酒的原料, 根煮水治痢疾。花朵美丽, 栽培供观赏用。枝干多刺可以为绿篱。