

形，顶端圆形而有小突尖头，基部渐狭成楔形，两侧微扁，腹棱稍钝，腹面和背棱上均有明显纵沟，表面具蜂窝状孔穴。花期冬春季，果期5—6月(在华北果期延至7—8月)。 $2n = 16, 24$ 。

我国各地均有栽培，但以长江流域以南各省最多，江苏北部和河南南部也有少数品种，某些品种已在华北引种成功。日本和朝鲜也有。

梅原产我国南方，已有三千多年的栽培历史，无论作观赏或果树均有许多品种。许多类型不但露地栽培供观赏，还可以栽为盆花，制作梅桩。鲜花可提取香精，花、叶、根和种仁均可入药。果实可食、盐渍或干制，或熏制成乌梅入药，有止咳、止泻、生津、止渴之效。梅又能抗根线虫危害，可作核果类果树的砧木。

7b. 厚叶梅(变种) 野梅

A. mume Sieb. var. **pallescent** (Franch.) Yü et Lu, comb. nov. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *pallescent* Franch. Pl. Delavay 197. 1890.

叶片较厚，近革质，卵形或卵状椭圆形；果实卵球形；核近球形，基部钝而成圆形。

产四川西部至云南西部。此种为梅的野生种，生于山坡林中或溪边，海拔1700—3100米。

7c. 长梗梅(变种)

A. mume Sieb. var. **cernua** (Franch.) Yü et Lu, comb. nov. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *cernua* Franch. Pl. Delavay 197. 1890; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:536. 1933; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:163. pl. 22. f. 8—9. 1968.

叶片披针形，先端渐尖；花梗长1厘米，结果时俯垂。

产云南西部至西北部。生于山坡路边、溪边或疏林下，海拔1900—2600米。越南北部和老挝北部也有分布。

梅的品种分果梅和花梅两大类。果梅的栽培品种，据曾勉教授在浙江的调查研究，大致分为三类，简述如下。

1. 白梅品种群 果实黄白色，质粗，味苦，核大肉少，供制梅干用。例如大白头、太公种等。成熟期在4月上、中旬。

2. 青梅品种群 果实青色或青黄色，味酸或稍带苦涩，品质中等，多数供制蜜饯用。例如四月梅、五月梅、白水梅等。成熟期为4月中、下旬。

3. 花梅品种群 果实红色或紫红色，质细脆而味稍酸，品质优良，供制陈皮梅、劈梅等用。例如软条梅、紫蒂梅、大叶猪肝、胭脂梅等。成熟期在5月上、中旬至6月。

花梅的品种，由于长期栽培，变异较大，品种甚多，据陈俊愉教授近期研究，分为以下四类。

1. 直脚梅类 (var. *mume*) 枝条直立或斜展，按花型和花色分为以下七型。

(1) 江梅型 (f. *simpliciflora* T. Y. Chen) 花碟形，单瓣，纯白、水红、肉色或桃红