

形，顶端圆形而有小突尖头，基部渐狭成楔形，两侧微扁，腹棱稍钝，腹面和背棱上均有明显纵沟，表面具蜂窝状孔穴。花期冬春季，果期5—6月(在华北果期延至7—8月)。 $2n = 16, 24$ 。

我国各地均有栽培，但以长江流域以南各省最多，江苏北部和河南南部也有少数品种，某些品种已在华北引种成功。日本和朝鲜也有。

梅原产我国南方，已有三千多年的栽培历史，无论作观赏或果树均有许多品种。许多类型不但露地栽培供观赏，还可以栽为盆花，制作梅桩。鲜花可提取香精，花、叶、根和种仁均可入药。果实可食、盐渍或干制，或熏制成乌梅入药，有止咳、止泻、生津、止渴之效。梅又能抗根线虫危害，可作核果类果树的砧木。

7b. 厚叶梅(变种) 野梅

A. mume Sieb. var. **pallescent** (Franch.) Yü et Lu, comb. nov. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *pallescent* Franch. Pl. Delavay 197. 1890.

叶片较厚，近革质，卵形或卵状椭圆形；果实卵球形；核近球形，基部钝而成圆形。

产四川西部至云南西部。此种为梅的野生种，生于山坡林中或溪边，海拔1700—3100米。

7c. 长梗梅(变种)

A. mume Sieb. var. **cernua** (Franch.) Yü et Lu, comb. nov. — *Prunus mume* Sieb. et Zucc. var. *cernua* Franch. Pl. Delavay 197. 1890; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:536. 1933; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:163. pl. 22. f. 8—9. 1968.

叶片披针形，先端渐尖；花梗长1厘米，结果时俯垂。

产云南西部至西北部。生于山坡路边、溪边或疏林下，海拔1900—2600米。越南北部和老挝北部也有分布。

梅的品种分果梅和花梅两大类。果梅的栽培品种，据曾勉教授在浙江的调查研究，大致分为三类，简述如下。

1. 白梅品种群 果实黄白色，质粗，味苦，核大肉少，供制梅干用。例如大白头、太公种等。成熟期在4月上、中旬。

2. 青梅品种群 果实青色或青黄色，味酸或稍带苦涩，品质中等，多数供制蜜饯用。例如四月梅、五月梅、白水梅等。成熟期为4月中、下旬。

3. 花梅品种群 果实红色或紫红色，质细脆而味稍酸，品质优良，供制陈皮梅、劈梅等用。例如软条梅、紫蒂梅、大叶猪肝、胭脂梅等。成熟期在5月上、中旬至6月。

花梅的品种，由于长期栽培，变异较大，品种甚多，据陈俊愉教授近期研究，分为以下四类。

1. 直脚梅类 (var. *mume*) 枝条直立或斜展，按花型和花色分为以下七型。

(1) 江梅型 (f. *simpliciflora* T. Y. Chen) 花碟形，单瓣，纯白、水红、肉色或桃红

等色。有 29 个品种,如单粉、单瓣红、杨贵妃、小玉蝶、白梅等。

(2) 官粉型 (*f. alphanthii* (Carr.) Rehd.) 花碟形,半重瓣至重瓣,粉红色。现知 75 个品种,如官粉、粉嘴子、千叶红、南京春、粉妆台阁等。

(3) 大红型 (*f. rubriflora* T. Y. Chen) 似官粉型而花色大红,开花特繁,甜香甚浓。有品种 15 个,如红梅、大红、小红、红星、天星红等。

(4) 朱砂型 (*f. purpurea* (Makino) T. Y. Chen) 花碟形,单瓣、半重瓣或重瓣,紫红色。已有 47 个品种,如白须朱砂、江南朱砂、骨里红等。

(5) 玉碟型 (*f. albo-plena* (Bailey) Rehd.) 花碟形,重瓣,白色;花萼绛紫色。有 30 个品种,如玉碟、粉碟、紫蒂白等。

(6) 绿萼型 (*f. viridicalyx* (Makino) T. Y. Chen) 花碟形,单瓣至半重瓣,白色;花萼绿色。已有 13 品种,如绿萼、单瓣绿萼、李花绿萼等。

(7) 洒金型 (*f. versicolor* T. Y. Chen et H. H. Lu) 花碟形,单瓣至重瓣,在一棵树上同时开近白色、粉红色与白底红条或白底红斑点的各色花朵,较为独特。现已知有 9 个品种,如洒金红、晚跳枝、二乔、五宝等。

2. 照水梅类 (*var. pendula* Sieb.) 枝条下垂,形成独特的伞状树姿,可分为以下六型。

(1) 单粉照水型 (*f. simplex* T. Y. Chen) 花碟形,单瓣,粉红或白色。现知有 3 个品种,如单粉照水、单瓣照水等。

(2) 双粉照水型 (*f. modesta* T. Y. Chen) 花碟形,半重瓣或重瓣,粉红色。有 2 个品种,即绫眼和东洋红照水。

(3) 骨红照水型 (*f. atropurpurea* T. Y. Chen) 花碟形,单瓣,深紫红色,如骨红照水。

(4) 残雪照水型 (*f. albiflora* T. Y. Chen) 花碟形,半重瓣,白色,如残雪照水。

(5) 白碧照水型 (*f. viridiflora* T. Y. Chen) 花碟形,单瓣或半重瓣,白色;花萼绿色,如双碧照水、单碧照水。

(6) 五宝照水型 (*f. marmorata* T. Y. Chen) 一棵树上同时开近白、粉红及白底红条纹或白底红斑点的,如五宝照水。

3. 龙游梅类 (*var. tortuosa* T. Y. Chen et H. H. Lu) 枝条自然扭曲如游龙;花碟形,半重瓣,白色,如龙游梅。

4. 杏梅类 (*var. bungo* Makino) 枝和叶似山杏;花半重瓣,粉红色,如杏梅、洋梅、送春等品种。花期较晚,抗寒性较强,可能是杏与梅的天然杂交种。