

2. 幼枝无毛或有微柔毛,苞片无毛或几无毛;花梗无毛,稀被短柔毛。

4 叶片下面被短柔毛,果红色、紫色或黄色和绿色,被蓝黑色果粉,通常有明显纵沟 4. 欧洲李 *P. domestica* L.

4 叶片下面无毛或多少有微柔毛或沿中脉被柔毛;果黄色或红色,不被蓝黑色果粉。

5. 花通常单生,很少混生 2 朵;叶片下面除中肋被毛外其余部分无毛;果核表面光滑或粗糙 5. 櫻桃李 *P. cerasifera* Ehrh.

5. 花通常 3 朵簇生,稀 2;叶片下面无毛或微被柔毛;果核常有沟纹。

6. 果实大,直径 5—7 厘米,叶片光滑无毛 6. 李 *P. salicina* Lindl.

6. 果实小,直径 1.5—2.5 厘米;果梗粗短,叶片下面多少被柔毛 7. 东北李 *P. ussuriensis* Kov. et Kost.

1. 杏李 红李(河北习见树木图说),秋根李(河北昌黎) 图版 5: 1—2

Prunus simonii Carr. in Rev. Hort. 1872:111. t. 1872; 陈嵘,中国树木分类学 476. 1937; 江苏南部种子植物手册 341. 1959; 俞德浚,中国果树分类学 57. f. 19. 1979. — *Persica simonii* Decaisne, Jard. Fruit. 7:43. 1872—75. — *Prunus persica* r. *nectarina* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 29:83. 1883. p. p.

乔木,高 5—8 米,树冠金字塔形,直立分枝;老枝紫红色,树皮起伏不平,常有裂痕;小枝浅红色,粗壮,节间短,无毛;冬芽卵圆形,紫红色,有数枚覆瓦状排列鳞片,边缘有细齿,通常无毛,极稀鳞片边缘有睫毛。叶片长圆倒卵形或长圆披针形,稀长椭圆形,长 7—10 厘米,宽 3—5 厘米,先端渐尖或急尖,基部楔形或宽楔形,边缘有细密圆钝锯齿,有时呈不明显重锯齿,幼时齿尖常带腺;上面深绿色,主脉和侧脉均明显下陷,下面淡绿色,中脉和侧脉均明显突起,侧脉弧形,与主脉呈锐角,两面无毛;托叶膜质,线形,先端长渐尖,边缘有腺,早落;叶柄长 1—1.3 厘米,无毛,通常在顶端两侧各有 1—2 腺体。花 (1)2—3 朵,簇生;花梗长 2—5 毫米,无毛;花直径 1.5—2 厘米,萼筒钟状,萼片长圆形,先端圆钝,边有带腺细齿,萼片与萼筒外面均无毛,内面在萼筒基部被短柔毛;花瓣白色,长圆形,先端圆钝,基部楔形,有短爪,着生在萼筒边缘;雄蕊多数,花丝长短不等,排成紧密 2 轮,长花丝比花瓣稍短或近等长;雌蕊 1,心皮无毛,柱头盘状,花柱比长雄蕊稍短或近等长。核果顶端扁球形,直径 3—5(—6) 厘米,红色,果肉淡黄色,质地紧密,有浓香味,粘核,微涩;核小,扁球形,有纵沟。 果期 6—7 月。

产我国华北地区。广泛栽培为果树。常见品种有香扁、荷包李、雁过红、腰子红等。抗寒力强,但抗病力不及普通李。

2. 黑刺李 刺李

Prunus spinosa L. Sp. Pl. 475. 1753; Ascherson & Graebner, Syn. Mitteleura. Fl. 6(2):119. 1906; 俞德浚,中国果树分类学 60. f. 21. 1979. — *Prunus domestica* l. *spinosa* (L.) Kuntze Taschen-Fl. Leipzig 274. 1869. — *Prunus spinosa* var. *typica* Schneid. ill. Handb. Laubh. 1:628. 1906.



1—2.杏李 *Prunus simonii* Carr.: 植株, 2.果核。 3.欧洲李 *Prunus domestica* L.: 3.果
枝。 4—5.李 *Prunus salicina* Lindl.: 植株,果核。(王金凤绘)