

组 2. 伞形组——Sect. *Phyllocerasus* (Koehne) Yü et Li, stat. nov.——Sect. 1. *Cremostosepulum* Koehne Subset. *Phyllocerasus* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 238. 1912.

本组有下列 4 种。

7. 康定樱桃 图版 7: 6—7

Cerasus tatsienensis (Batal.) Yü et Li, comb. nov.——*Prunus tatsienensis* Batal. in Act. Hort. Petrop. 14: 322. 1895.

灌木或小乔木,高 2—5 米,树皮灰褐色。小枝灰色,嫩枝绿色,被疏柔毛或无毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片卵形或卵状椭圆形,长 1—4.5 厘米,宽 1—2.5 厘米,先端渐尖,基部圆形,边有重锯齿,齿端有小腺体,上面绿色,几无毛,下面淡绿色,无毛或脉腋有簇毛,侧脉 6—9 对;叶柄长 0.8—1 厘米,无毛或被疏柔毛,顶端有腺或无腺体;托叶椭圆披针形或卵状披针形,边有锯齿,齿端有盘状腺体。花序伞形或近伞形,有花 2—4 朵,花叶同开;总苞片紫褐色,匙形,长约 8 毫米,宽约 4 毫米,外面无毛或被疏长毛,总梗长 5—12 毫米,无毛或被疏柔毛;苞片绿色,果实宿存,椭圆形或近圆形,直径 3—5 毫米,边缘齿端有盘状腺体;总梗长 1—2 厘米,无毛,花直径约 1.5 厘米;萼筒钟状,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,无毛,萼片卵状三角形、先端急尖或钝,全缘或有疏齿,长约为萼筒的一半;花瓣白色或粉红色,卵圆形;雄蕊 20—35 枚;花柱与雄蕊近等长,柱头头状。花期 4—6 月。

产山西、陕西、河南、湖北、四川、云南。生于林中,海拔 900—2600 米。模式标本采自四川康定。

本种与微毛樱桃 *C. clarifolia* (Schneid.) Yü et Li 相近,惟本种苞片边缘腺体呈盘状,可以区别。

8. 迎春樱桃 图版 8: 1—4

Cerasus discoidea Yü et Li 植物分类学报 23(3): 211. 1985.

小乔木,高 2—3.5 米,树皮灰白色。小枝紫褐色,嫩枝被疏柔毛或脱落无毛。冬芽卵球形,无毛。叶片倒卵状长圆形或长椭圆形,长 4—8 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,先端骤尾尖或尾尖,基部楔形,稀近圆形,边有缺刻状急尖锯齿,齿端有小盘状腺体,上面暗绿色,伏生疏柔毛,下面淡绿色,被疏柔毛,嫩时较密,侧脉 8—10 对;叶柄长 5—7 毫米,幼时被稀疏柔毛,以后脱落几无毛,顶端有 1—3 腺体;托叶狭带形,长 5—8 毫米,边缘有小盘状腺体。花先叶开放或稀花叶同开,伞形花序有花 2 朵,稀 1 或 3 朵,基部常有褐色革质鳞片;总苞片褐色,倒卵状椭圆形,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,外面无毛,内面伏生疏柔毛,顶端有齿裂,边缘有小头状腺体;总梗长 3—10 毫米,被稀疏柔毛或无毛,内藏于革质鳞片内或微伸出;苞片革质,绿色,近圆形,直径 2—4 毫米,边有小盘状腺体,几无毛;花梗长 1—1.5 厘米,被稀疏柔毛;萼筒管形钟状,长 4—5 毫米,宽 2—3 毫米,外面被稀疏柔毛,萼片长圆形,长 2—3 毫米,先端圆钝或有小尖头;花瓣粉红色;长椭圆形,先端二裂;雄蕊 32—40;

花柱无毛,柱头扩大。核果红色,成熟后直径约1厘米;核表面略有稜纹。花期3月,果期5月。

产安徽、浙江、江西。生于山谷林中或溪边灌丛中,海拔200—1100米。

本种与短梗尾叶樱桃 *C. dielsiana* var. *abbreviata* (Card.) Yü et Li 外形相似,不同在于后者叶片、托叶边缘锯齿顶端有锥状小腺体,苞片边缘常呈撕裂状,裂齿顶端有长柄腺体。过去有人常将此种误定名为尾叶樱桃 *C. dielsiana* (Schneid.) Yü et Li,不同在于本种叶片、托叶、苞片边缘锯齿顶端的腺无柄,呈盘形,花2朵,稀1或3朵,叶片上下两面伏生疏柔毛,可以区别。


9. 微毛樱桃(秦岭植物志) 微毛野樱桃(经济植物手册),西南樱桃(湖北植物志) 图版7: 1—4

Cerasus clarifolia (Schneid.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus clarifolia* Schneid. in Fedde, Repert. Nov. Sp. 1: 67. 1905; Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 239. 1912. — *Prunus tatsienensis* Batal. var. *pilosiuscula* Schneid. in Fedde, Repert. Sp. nov. 1: 66. 1905. — *Prunus pilosiuscula* (Schneid.) Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 202. 1912; 中国高等植物图鉴 2: 311. 图 2352. 1972. — *Prunus pilosiuscula* var. *medica* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 204. 1912. — *Prunus pilosiuscula* var. *subvestita* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 204. 1912. — *P. venusta* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 239. 1912.

灌木或小乔木,高2.5—20米,树皮灰黑色。小枝灰褐色,嫩枝紫色或绿色,无毛或多少被疏柔毛。冬芽卵形,无毛。叶片卵形,卵状椭圆形,或倒卵状椭圆形,长3—6厘米,宽2—4厘米,先端渐尖或骤尖,基部圆形,边有单锯齿或重锯齿,齿渐尖,齿端有小腺体或不明显,上面绿色,疏被短柔毛或无毛,下面淡绿色,无毛或被疏柔毛,侧脉7—12对;叶柄长0.8—1厘米,无毛或被疏柔毛;托叶披针形,边有腺齿或有羽状分裂腺齿。花序伞形或近伞形,有花2—4朵,花叶同开;总苞片褐色,匙形,长约0.8毫米,宽3—4毫米,外面无毛,内面被疏柔毛;总梗长4—10毫米,无毛或被疏柔毛;苞片绿色,果时宿存,近卵形、卵状长圆形或近圆形,直径2—5毫米,边有锯齿,齿端有锥状或头状腺体;花梗长1—2厘米,无毛或被稀疏柔毛;萼筒钟状,无毛或几无毛,萼片卵状三角形或披针状三角形,先端急尖或渐尖,边有腺齿或全缘;花瓣白色或粉红色,倒卵形至近圆形;雄蕊20—30枚;花柱基部有疏柔毛,比雄蕊稍短或稍长,柱头头状。核果红色,长椭圆形,纵径7—8毫米,横径4—5毫米;核表面微具稜纹。花期4—6月,果期6—7月。

产河北、山西、陕西、甘肃、湖北、四川、贵州、云南。生于山坡林中或灌丛中,海拔800—3600米。模式标本采自四川省南川。

本种在我国上述地区常见, Schneider (1905) 曾将 Henry 5295 (采自湖北) 标本命名为 *Prunus litiginosa* Schneid., 据记载花瓣狭长圆形,顶端急尖,雄蕊35—40枚,后来



1—4. 迎春樱桃 *Cerasus discoidea* Yü et Li: 1. 果枝, 2. 苞片, 3. 盘状腺体, 4. 花纵剖面。
 5—9. 尾叶樱桃 *Cerasus dielsiana* (Schneid.) Yü et Li: 5. 花序 6—7. 苞片, 8. 花瓣, 9. 叶片。
 10—13. 浙闽樱桃 *Cerasus schneideriana* (Koehne) Yü et Li: 10. 花序, 11. 苞片, 12. 锥状腺体, 13. 花瓣。(刘春荣绘)