

早落。花序伞形,通常2朵,稀1或3朵;总苞长圆形,先端圆钝;花梗长1.8—3.8毫米,被毛;苞片绿褐色,边有锯齿,齿端腺体锥状,有柄;花梗长1—1.4厘米,密被褐色微硬毛;萼筒筒状,长3—4毫米,宽2—3毫米,伏生褐色短柔毛,萼片反折,带状披针形,与萼筒近等长,先端圆钝;花瓣卵形,先端二裂;雄蕊约40枚,短于花瓣;花柱比雄蕊短,基部及子房疏生微硬毛。核果紫红色,长椭圆形,纵径8毫米,横径约5毫米,表面有稜纹。花期3月,果期5月。

产浙江、福建、广西。生于林中,海拔600—1300米。模式标本采自浙江宁波。

本种与短柄尾叶樱桃 *C. dielsiana* (Schneid.) Yü et Li var. *abbreviata* (Card) Yü et Li 接近,不同在于本种萼片与萼筒近等长,花柱被毛,可以区别。

18. 櫻桃(名医别录) 莺桃(本草纲目),荆桃(尔雅),楔桃(广雅),英桃、牛桃(博物志),櫻珠(江苏) 图版9: 1—2

Cerasus pseudocerasus (Lindl.) G. Don in London, Hort. Brit. 200. 1830; 俞德浚,中国果树分类学 65,图 22. 1979. — *Prunus pseudocerasus* Lindl. in Trans. Hort. Soc. Lond. 6: 90. 1852; 陈嵘,中国树木分类学 472. 图 366. 1973; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 343. 图 545. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 312. 图 2353. 1972; 秦岭植物志 1(2): 586. 1974. — *Prunus pauciflora* Bge. in Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. Sav. Etrang. 2: 97. 1835. — *Prunus involucrata* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 206. 1912. — *Prunus paniculata* auct. non Thunb; Ker, Bot. Reg. 10: t. 800. 1824. exclud. descr.

乔木,高2—6米,树皮灰白色。小枝灰褐色,嫩枝绿色,无毛或被疏柔毛。冬芽卵形,无毛。叶片卵形或长圆状卵形,长5—12厘米,宽3—5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,基部圆形,边有尖锐重锯齿,齿端有小腺体,上面暗绿色,近无毛,下面淡绿色,沿脉或脉间有稀疏柔毛,侧脉9—11对;叶柄长0.7—1.5厘米,被疏柔毛,先端有1或2个大腺体;托叶早落,披针形,有羽裂腺齿。花序伞房状或近伞形,有花3—6朵,先叶开放;总苞倒卵状椭圆形,褐色,长约5毫米,宽约3毫米,边有腺齿;花梗长0.8—1.9厘米,被疏柔毛;萼筒钟状,长3—6毫米,宽2—3毫米,外面被疏柔毛,萼片三角卵圆形或卵状长圆形,先端急尖或钝,边缘全缘,长为萼筒的一半或过半;花瓣白色,卵圆形,先端下凹或二裂;雄蕊30—35枚,栽培者可达50枚;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果近球形,红色,直径0.9—1.3厘米。花期3—4月,果期5—6月。

产辽宁、河北、陕西、甘肃、山东、河南、江苏、浙江、江西、四川。生于山坡阳处或沟边,常栽培,海拔300—600米。

本种在我国久经栽培,品种颇多,供食用,也可酿樱桃酒。枝、叶、根、花也可供药用。

19. 崖櫻桃(秦岭植物志)

Cerasus scopulorum (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *prunus scopulorum* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:241, 1912; 秦岭植物志 1(2): 586. 图481. 1974; 湖北植物志 2,

229. 图 1052. 1979.

乔木, 高达 3—8 米, 树皮红褐色。小枝灰褐色, 被短柔毛或疏柔毛。冬芽长椭圆形, 无毛或微被毛。叶片长椭圆形或卵状椭圆形, 长 5—11 厘米, 宽 3—6 厘米, 先端尾尖或骤尾尖, 基部近圆形, 边有不整齐单锯齿, 稀重锯齿, 齿端有小腺体, 上面近深绿色, 无毛, 下面淡绿色, 脉上被疏柔毛, 以后脱落无毛; 叶柄长 5—12 毫米, 无毛; 托叶狭带形, 比叶柄短, 边有腺齿, 早落。花序伞形, 有花 3—7 朵, 先叶开放; 总苞片褐色, 倒卵状长圆形, 长约 8 毫米, 宽约 5 毫米, 外面被稀疏柔毛, 内面密被伏生长柔毛; 总梗长 2—9 毫米, 被疏柔毛; 苞片小, 长 1—2.5 毫米, 边有缺刻状锯齿, 早落。花梗长 1—2 厘米, 疏被长柔毛; 萼筒管形钟状, 长 6—7 毫米, 宽 3—4 毫米, 外面伏生疏毛, 萼片卵圆形, 长 2—3 毫米, 先端圆钝或急尖, 边全缘, 有缘毛, 开花后反折; 花瓣白色, 长椭圆形, 先端二裂; 雄蕊 34—48 枚; 花柱与雄蕊近等长, 无毛。核果红色, 卵球形, 长约 1.2 厘米; 核表面略具稜纹。花期 3 月, 果期 5 月。

产陕西、甘肃、湖北、四川、贵州。生于山谷林中, 海拔 700—1200 米。模式标本采自湖北西部。

20. 西南樱桃

Cerasus duclouxii (Koehne) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus duclouxii* Koehne in Sarg. Pl. Wils 1:242. 1912.

乔木或灌木, 高约 4 米。小枝灰色或灰褐色, 被稀疏柔毛或无毛。冬芽长卵形, 无毛。叶片倒卵椭圆形或椭圆形, 长 3.5—5 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端骤尖, 基部圆形或楔形, 边有尖锐锯齿, 齿端有小腺体, 上面绿色, 疏被短毛或无毛, 下面淡绿色, 疏被柔毛或仅脉腋有簇毛, 侧脉 7—9 对; 叶柄长 0.8—1 厘米, 疏被短毛或无毛; 托叶线形, 边有腺齿。花序近伞形, 有花 3—5 朵, 先叶开放, 下部有褐色革质鳞片包被, 果时脱落; 总苞椭圆形, 长 3.5—4 毫米, 宽 2—3 毫米, 外面无毛, 内面密被柔毛; 总梗长 0—3 毫米, 密被开展柔毛; 苞片很小, 长约 1 毫米, 边有腺齿; 花梗长 3—4 毫米, 从总苞中伸出, 密被短柔毛; 萼筒钟状, 长 3—4 毫米, 宽 2—3 毫米, 被短柔毛, 萼片卵状三角形, 先端圆钝, 外被柔毛, 边缘有稀疏腺点; 花瓣白色, 卵形, 先端下凹, 稀不明显; 雄蕊约 33 枚; 花柱与雄蕊近等长, 基部有稀疏柔毛。核果卵球形或椭圆形, 纵径长 7—8 毫米, 横径长 5—6 毫米; 核表面略有稜纹。花期 3 月, 果期 5 月。

产四川、云南。生于山谷林中或有栽培, 海拔达 2300 米。模式标本采自云南昆明。

本种总梗极短, 开花时被包藏在革质的鳞片内, 花较小, 花柱基部或多或少有毛, 可与崖樱桃 *C. scopulorum* (Koehne) Yü et Li 相区别。在叶和外形上与细花樱桃 *C. pusilliflora* (Card.) Yü et Li 相似, 但后者花梗完全无毛, 花瓣先端大多不下凹, 稍微下凹, 可以区别。