

5—6 毫米, 宽 3—4 毫米, 无毛或被稀疏柔毛, 萼片三角形至卵形, 长 2—3 毫米, 内面无毛或有稀疏伏毛, 先端急尖或钝, 边有腺齿; 花瓣白色或淡粉红色, 倒卵形; 先端圆钝; 雄蕊 25—36, 短于花瓣; 花柱与雄蕊近等长或伸出长于雄蕊, 下部或基部有疏柔毛。核果紫红色, 多肉质, 卵球形, 直径 1.3—1.5 厘米; 核表面有显著突出的稜纹。果梗长 10—2.5 厘米, 先端粗厚, 无毛。花期 5—6 月, 果期 7—10 月。

产甘肃、四川、云南、西藏。生于山坡、沟谷林中或草坡, 海拔 1000—4000 米。模式标本采自四川灌县。

本种在我国四川西部生长普遍, 果实大而肉汁丰富, 此外少量分布附近省区, 与托叶櫻桃 *C. stipulacea* (Maxim.) Yü et Li 接近, 但本种叶边重锯齿大多由 2—3 齿组成, 果梗顶端较粗, 果实较大, 果实表面有显著突出的稜纹, 可以区别。

29. 山楂叶櫻桃 山楂叶櫻(经济植物手册) 图版 12: 1—2

Cerasus crataegifolius (Hand.-Mazz.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus crataegifolius* Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Ak. W. W. 60:153. 1923, et Symb. Sin. 7:533. f. 19. 1933.

灌木, 偃伏或上升, 高 1—2 米, 树皮灰褐色; 小枝紫褐色, 嫩枝密被伏生柔毛。冬芽长卵形, 顶端尖, 无毛。叶片椭圆卵形或椭圆披针形, 长 1.5—4 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端渐尖或急尖, 基部楔形或宽楔形, 边有尖锐重锯齿, 并分裂成小裂片, 上面暗绿色, 稀生短毛, 下面淡绿色, 无毛或幼时沿中脉伏生短毛; 叶柄长 3—5 毫米, 被疏柔毛; 托叶褐色, 线形, 长 5—10 毫米。花单生或 2 朵簇生, 无总梗, 花叶同开; 总苞片早落; 花梗长 1.5—2.5 厘米, 无毛; 花直径 1.2—1.5 厘米; 萼筒管状, 长 6—8 毫米, 宽 2—3 毫米, 无毛, 萼片三角形, 长 2—3 毫米, 先端急尖或钝尖, 边有腺齿; 花瓣粉红色或白色, 近圆形, 先端啮蚀状; 雄蕊 27—31; 花后花柱伸出远长于雄蕊, 无毛。核果卵球形, 红色, 纵径 8—10 毫米, 横径 6—8 毫米; 核表面有稜纹。花期 6—7 月, 果期 8—9 月。

产云南、西藏。生于高山林下或岩石坡灌丛中, 海拔 3400—4000 米。模式标本采自云南西北部。

本种为高山偃伏或上升灌木, 叶边有尖锐重锯齿并分裂成小裂片, 花单生或 2 朵簇生, 无总梗, 花叶同开, 苞片早落, 花后花柱伸出远长于雄蕊, 易于识别。

30. 偃櫻桃 偃櫻(经济植物手册) 图版 12: 3

Cerasus mugus (Hand.-Mazz.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus mugus* Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Ak. W. W. 60:152. 1923, et Symb. Sin. 7: 532. 1933.

偃伏灌木, 高 1 米, 树皮灰褐色。小枝棕褐色或灰褐色, 嫩枝密被伏生柔毛。冬芽卵状长椭圆形, 顶端渐尖, 无毛。叶片倒卵形或倒卵状椭圆形, 长 1—3.5 厘米, 宽 0.7—2 厘米, 先端圆钝或急尖, 基部楔形, 叶边有尖锐重锯齿, 上面深绿色, 无毛或幼时被稀疏柔毛, 下面浅绿色, 无毛, 侧脉 5—9 对; 叶柄长 2—7 毫米, 无毛; 托叶线形, 长 5—8 毫米, 边有腺体。



1—2.山楂叶樱桃 *Cerasus crataegifolius* (Hand.-Mazz.) Yü; et Li: 1.果枝, 2.花纵剖面。3.偃樱桃 *Cerasus rugus* (Hand.-Mazz.) Yü et Li; 叶片。4—6.细齿樱桃 *Cerasus serrula* (Franch.) Yü et Li; 4.叶片, 5.果实, 6.核。(刘春荣绘)