

33c. 日本晚樱(变种)(拉汉种子植物名称)

C. serrulata G. Don var. **lannesiana** (Carr.) Makino in Jour. Jap. Bot. 5:13. 45. 1928.——*Prunus serrulata* var. *lannesiana* (Carr.) Makino l. c. 1928.——*Cerasus lannesiana* Carr in Rev. Hort. 1872: 198; 1873: 351. t. 1873.——*Prunus lannesiana* Wils. Cherries Jap. 43. 1916; Koehne in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 1917 (26):25. f. 6a—6c. 1918.——*Prunus serrulata* Lindl. var. *lannesiana* (Carr.) Rehd., Man. Trees & Shrubs ed. 2. 472. 1940; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 345. 图 548. 1959.

本变种叶边有渐尖重锯齿, 齿端有长芒, 花常有香气。花期 3—5 月。

我国各地庭园栽培, 引自日本, 供观赏用。

樱花在日本有悠久的栽培历史, 园艺品种极多, 有日本国花之誉。主要由本种及其变种与其他种类杂交培育而成。按花色分有纯白、粉白、深粉至淡黄色, 幼叶有黄绿、红褐至紫红诸色, 花瓣有单瓣、半重瓣至重瓣之别。每年四、五月间樱花盛开, 繁花似锦, 游人如织, 万家空巷, 为日本人民重大节日之一。

组 9. 细齿组——Sect. *Serrula* (Koehne) Yü et Li, stat. nov.——Sect. 2. *Pseudocerasus* Koehne Subsect. *Serrula* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 252. 1912.

本组有下列 5 种。

34. 华中樱桃 康拉樱(经济植物手册), 单齿樱花(湖北植物志) 图版 13: 1—2

Cerasus conradinae (Koehne) Yü et Li, comb. nov.——*Prunus conradinae* Koe. hne in Sarg. Pl. Wils. 1:211. 1912; Rehd., Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2. 471 1940.——*Prunus avium* auct. non L. 1753: Franch. Pl. Delav. 197. 1890.

乔木, 高 3—10 米, 树皮灰褐色。小枝灰褐色, 嫩枝绿色, 无毛。冬芽卵形, 无毛。叶片倒卵形、长椭圆形或倒卵状长椭圆形, 长 5—9 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端骤渐尖, 基部圆形, 边有向前伸展锯齿, 齿端有小腺体, 上面绿色, 下面淡绿色, 两面均无毛, 有侧脉 7—9 对; 叶柄长 6—8 毫米, 无毛, 有 2 腺; 托叶线形, 长约 6 毫米, 边有腺齿, 花后脱落。伞形花序, 有花 3—5 朵, 先叶开放, 直径约 1.5 厘米; 总苞片褐色, 倒卵椭圆形, 长约 8 毫米, 宽约 4 毫米, 外面无毛, 内面密被疏柔毛; 总梗长 0.4—1.5 厘米, 稀总梗不明显, 无毛; 苞片褐色, 宽扇形, 长约 1.3 毫米, 有腺齿, 果时脱落; 花梗长 1—1.5 厘米, 无毛; 萼筒管形钟状, 长约 4 毫米, 宽约 3 毫米, 无毛, 萼片三角卵形, 长约 2 毫米, 先端圆钝或急尖; 花瓣白色或粉红色, 卵形或倒卵圆形, 先端二裂; 雄蕊 32—43; 花柱无毛, 比雄蕊短或稍长。核果卵球形, 红色, 纵径 8—11 毫米, 横径 5—9 毫米; 核表面棱纹不显著。花期 3 月, 果期 4—5 月。

产陕西、河南、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西。生于沟边林中, 海拔 500—2100 米。模式标本采自湖北西部。