

33c. 日本晚樱(变种)(拉汉种子植物名称)

C. serrulata G. Don var. **lannesiana** (Carr.) Makino in Jour. Jap. Bot. 5:13. 45. 1928.——*Prunus serrulata* var. *lannesiana* (Carr.) Makino l. c. 1928.——*Cerasus lannesiana* Carr in Rev. Hort. 1872: 198; 1873: 351. t. 1873.——*Prunus lannesiana* Wils. Cherries Jap. 43. 1916; Koehne in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. 1917 (26):25. f. 6a—6c. 1918.——*Prunus serrulata* Lindl. var. *lannesiana* (Carr.) Rehd., Man. Trees & Shrubs ed. 2. 472. 1940; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 345. 图 548. 1959.

本变种叶边有渐尖重锯齿, 齿端有长芒, 花常有香气。花期 3—5 月。

我国各地庭园栽培, 引自日本, 供观赏用。

樱花在日本有悠久的栽培历史, 园艺品种极多, 有日本国花之誉。主要由本种及其变种与其他种类杂交培育而成。按花色分有纯白、粉白、深粉至淡黄色, 幼叶有黄绿、红褐至紫红诸色, 花瓣有单瓣、半重瓣至重瓣之别。每年四、五月间樱花盛开, 繁花似锦, 游人如织, 万家空巷, 为日本人民重大节日之一。

组 9. 细齿组——Sect. *Serrula* (Koehne) Yü et Li, stat. nov.——Sect. 2. *Pseudocerasus* Koehne Subsect. *Serrula* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 252. 1912.


本组有下列 5 种。

34. 华中樱桃 康拉樱(经济植物手册), 单齿樱花(湖北植物志) 图版 13: 1—2

Cerasus conradinae (Koehne) Yü et Li, comb. nov.——*Prunus conradinae* Koe. hne in Sarg. Pl. Wils. 1:211. 1912; Rehd., Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 2. 471 1940.——*Prunus avium* auct. non L. 1753: Franch. Pl. Delav. 197. 1890.

乔木, 高 3—10 米, 树皮灰褐色。小枝灰褐色, 嫩枝绿色, 无毛。冬芽卵形, 无毛。叶片倒卵形、长椭圆形或倒卵状长椭圆形, 长 5—9 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端骤渐尖, 基部圆形, 边有向前伸展锯齿, 齿端有小腺体, 上面绿色, 下面淡绿色, 两面均无毛, 有侧脉 7—9 对; 叶柄长 6—8 毫米, 无毛, 有 2 腺; 托叶线形, 长约 6 毫米, 边有腺齿, 花后脱落。伞形花序, 有花 3—5 朵, 先叶开放, 直径约 1.5 厘米; 总苞片褐色, 倒卵椭圆形, 长约 8 毫米, 宽约 4 毫米, 外面无毛, 内面密被疏柔毛; 总梗长 0.4—1.5 厘米, 稀总梗不明显, 无毛; 苞片褐色, 宽扇形, 长约 1.3 毫米, 有腺齿, 果时脱落; 花梗长 1—1.5 厘米, 无毛; 萼筒管形钟状, 长约 4 毫米, 宽约 3 毫米, 无毛, 萼片三角卵形, 长约 2 毫米, 先端圆钝或急尖; 花瓣白色或粉红色, 卵形或倒卵圆形, 先端二裂; 雄蕊 32—43; 花柱无毛, 比雄蕊短或稍长。核果卵球形, 红色, 纵径 8—11 毫米, 横径 5—9 毫米; 核表面棱纹不显著。花期 3 月, 果期 4—5 月。

产陕西、河南、湖南、湖北、四川、贵州、云南、广西。生于沟边林中, 海拔 500—2100 米。模式标本采自湖北西部。



1—2. 华中樱桃 *Cerasus conradinae* (Koehne) Yü et Li: 1. 果枝, 2. 花纵剖面。3—4 钟花樱桃 *Cerasus campanulata* (Maxim.) Yü et Li: 3. 果枝, 4. 花纵剖面。5—7. 高盆樱桃 *Cerasus cerasoides* (D. Don) Sok.: 5. 叶片, 6. 花纵剖面, 7. 果实。(刘春荣绘)

本种外形与崖樱桃 *C. scopulorum* (Koehne) Yü et Li 近似, 但本种小枝、叶、花梗、萼筒均无毛, 可以区别。

35. **钟花樱桃** 福建山樱花(中国树木分类学), 山樱花、绯樱(台湾植物志) 图版 13: 3—4

Cerasus campanulata (Maxim.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus campanulata* Maxim. in Bull. Acad. Petersb. **29**:103. 1883; 陈嵘, 中国树木分类学 479. 图 375. 137; 中国高等植物图鉴 **2**: 307. 图 2344. 1972. — *Prunus puddum* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat. **2**:90. 1865. — *Prunus cerasoides* D. Don var. *campanulata* Koidz. in Journ. Coll. Sci. Tokyo **34**(2):264. f. 2. 1910.

乔木或灌木, 高 3—8 米, 树皮黑褐色。小枝灰褐色或紫褐色, 嫩枝绿色, 无毛。冬芽卵形, 无毛。叶片卵形、卵状椭圆形或倒卵状椭圆形, 薄革质, 长 4—7 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端渐尖, 基部圆形, 边有急尖锯齿, 常稍不整齐, 上面绿色, 无毛, 下面淡绿色, 无毛或脉腋有簇毛, 侧脉 8—12 对; 叶柄长 8—13 毫米, 无毛, 顶端常有腺体 2 个; 托叶早落。伞形花序, 有花 2—4 朵, 先叶开放, 花直径 1.5—2 厘米; 总苞片长椭圆形, 长约 5 毫米, 宽约 3 毫米, 两面伏生长柔毛, 总梗短, 长 2—4 毫米; 苞片褐色, 稀绿褐色, 长 1.5—2 毫米, 边有腺齿; 花梗长 1—1.3 厘米, 无毛或稀被极短柔毛; 萼筒钟状, 长约 6 毫米, 宽约 3 毫米, 无毛或被极稀疏柔毛, 基部略膨大, 萼片长圆形, 长约 2.5 毫米, 先端圆钝, 全缘; 花瓣倒卵状长圆形, 粉红色, 先端颜色较深, 下凹, 稀全缘; 雄蕊 39—41 枚; 花柱通常比雄蕊长, 稀稍短, 无毛。核果卵球形, 纵长约 1 厘米, 横径 5—6 毫米, 顶端尖; 核表面微具棱纹; 果梗长 1.5—2.5 厘米, 先端稍膨大并有萼片宿存。花期 2—3 月, 果期 4—5 月。

产浙江、福建、台湾、广东、广西。生于山谷林中及林缘, 海拔 100—600 米。日本、越南也有分布。模式标本采自福建。

早春着花, 颜色鲜艳, 在华东、华南可栽培, 供观赏用。

36. **高盆樱桃** 箬樱桃(云南), 云南欧李(中国高等植物图鉴)

Cerasus cerasoides (D. Don) Sok. Gep. Kyct. **3**:736. — *Prunus cerasoides* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 239. 1825; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:606. f. 339a—340f. 1904; Koehne in Pl. Wils. **1**:253. 1912; Hara, Fl. E. Himal. 1251. 1966. Pl. 12 ab; 中国高等植物图鉴 **2**: 308. f. 2345. 1972. — *Cerasus puddum* Seringe in DC. Prodr. **2**:537. Nov. 1825; Roxb. apud Wall. Pl. As. Rar. **2**:37, t. 143. 1831. — *Prunus puddum* (non Miq. 1856) Roxb. ex Brandis For. Fl. Brit. Ind. 194. 1874; Fl. Brit. Ind. **2**:314. 1878. — *Maddenia pedicellata* Hook. f. in Fl. Br. Ind. **2**:318. 1878; Hara in Journ. Jap. Bot. **51**:9. 1976; Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **2**:141. 1979. — *Prunus majestica* Koehne in Sarg. Pl. Wils. **1**:232. 1912; *Prunus cerasoides* var. *majestica* (Koehne) Ingram in Gard. Chron. ser. 3. 122. 1947. — *Prunus cerasoides* var. *tibetica*