

本种外形与崖樱桃 *C. scopulorum* (Koehne) Yü et Li 近似, 但本种小枝、叶、花梗、萼筒均无毛, 可以区别。

35. **钟花櫻桃** 福建山櫻花(中国树木分类学), 山櫻花、绯櫻(台湾植物志) 图版 13: 3—4

***Cerasus campanulata*** (Maxim.) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus campanulata* Maxim. in Bull. Acad. Petersb. **29**:103. 1883; 陈嵘, 中国树木分类学 479. 图 375. 137; 中国高等植物图鉴 **2**: 307. 图 2344. 1972. — *Prunus puddum* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat. **2**:90. 1865. — *Prunus cerasoides* D. Don var. *campanulata* Koidz. in Journ. Coll. Sci. Tokyo **34**(2):264. f. 2. 1910.

乔木或灌木, 高 3—8 米, 树皮黑褐色。小枝灰褐色或紫褐色, 嫩枝绿色, 无毛。冬芽卵形, 无毛。叶片卵形、卵状椭圆形或倒卵状椭圆形, 薄革质, 长 4—7 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端渐尖, 基部圆形, 边有急尖锯齿, 常稍不整齐, 上面绿色, 无毛, 下面淡绿色, 无毛或脉腋有簇毛, 侧脉 8—12 对; 叶柄长 8—13 毫米, 无毛, 顶端常有腺体 2 个; 托叶早落。伞形花序, 有花 2—4 朵, 先叶开放, 花直径 1.5—2 厘米; 总苞片长椭圆形, 长约 5 毫米, 宽约 3 毫米, 两面伏生长柔毛, 总梗短, 长 2—4 毫米; 苞片褐色, 稀绿褐色, 长 1.5—2 毫米, 边有腺齿; 花梗长 1—1.3 厘米, 无毛或稀被极短柔毛; 萼筒钟状, 长约 6 毫米, 宽约 3 毫米, 无毛或被极稀疏柔毛, 基部略膨大, 萼片长圆形, 长约 2.5 毫米, 先端圆钝, 全缘; 花瓣倒卵状长圆形, 粉红色, 先端颜色较深, 下凹, 稀全缘; 雄蕊 39—41 枚; 花柱通常比雄蕊长, 稀稍短, 无毛。核果卵球形, 纵长约 1 厘米, 横径 5—6 毫米, 顶端尖; 核表面微具棱纹; 果梗长 1.5—2.5 厘米, 先端稍膨大并有萼片宿存。花期 2—3 月, 果期 4—5 月。

产浙江、福建、台湾、广东、广西。生于山谷林中及林缘, 海拔 100—600 米。日本、越南也有分布。模式标本采自福建。

早春着花, 颜色鲜艳, 在华东、华南可栽培, 供观赏用。

36. **高盆櫻桃** 簕櫻桃(云南), 云南欧李(中国高等植物图鉴)

***Cerasus cerasoides*** (D. Don) Sok. Gep. Kyt. **3**:736. — *Prunus cerasoides* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 239. 1825; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:606. f. 339a—340f. 1904; Koehne in Pl. Wils. **1**:253. 1912; Hara, Fl. E. Himal. 1251. 1966. Pl. 12 ab; 中国高等植物图鉴 **2**: 308. f. 2345. 1972. — *Cerasus puddum* Seringe in DC. Prodr. **2**:537. Nov. 1825; Roxb. apud Wall. Pl. As. Rar. **2**:37, t. 143. 1831. — *Prunus puddum* (non Miq. 1856) Roxb. ex Brandis For. Fl. Brit. Ind. 194. 1874; Fl. Brit. Ind. **2**:314. 1878. — *Maddenia pedicellata* Hook. f. in Fl. Br. Ind. **2**:318. 1878; Hara in Journ. Jap. Bot. **51**:9. 1976; Hara et Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal **2**:141. 1979. — *Prunus majestica* Koehne in Sarg. Pl. Wils. **1**:232. 1912; *Prunus cerasoides* var. *majestica* (Koehne) Ingram in Gard. Chron. ser. 3. 122. 1947. — *Prunus cerasoides* var. *tibetica*

Schneid. in Repert. Sp. Reg. Veg. 1:54. 1905. p.p.

36a. 高盆櫻桃(原变种) 图版 13: 5—7

**C. cerasoides var. cerasoides**

乔木,高 3—10 米;枝幼时绿色,被短柔毛,不久脱落;老枝灰黑色,叶片卵状披针形或长圆披针形,长(4)—8—12 厘米,宽(2.2—)3.2—4.8 厘米,先端长渐尖,基部圆钝,叶边有细锐重锯齿或单锯齿,齿端有小头状腺,侧脉 10—15 对,上面深绿色,下面淡绿、无毛,网脉细密,近革质;叶柄长 1.2—2 厘米,先端有 2—4 腺;托叶线形,基部羽裂并有腺齿。总苞片大形,先端深裂,花后凋落,长 1—1.2 厘米;花梗长 1—1.5 厘米,无毛,花 1—3,伞形排列,与叶同时开放;苞片近圆形,边有腺齿,革质,花后宿存或脱落;花梗长 1—2 厘米,果期长达 3 厘米,先端肥厚;萼筒钟状,常红色;萼片三角形,先端急尖,长 4—55 毫米,全缘,常带红色;花瓣卵圆形,先端圆钝或微凹,淡粉色至白色;雄蕊 32—34,短于花瓣;花柱与雄蕊等长,无毛,柱头盘状。核果圆卵形,长 12—15 毫米,直径 8—12 毫米,熟时紫黑色;核圆卵形,顶端圆钝,边有深沟和孔穴。花期 10 月至 12 月。2n = 16。

产云南、西藏南部。生于沟谷密林中,海拔 1300—2200 米。克什米尔地区、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸北部也有分布。

果实可食,云南个别地区作郁李仁代用品。

Koehne 根据在云南省蒙自所采标本发表新种 *P. majestica* Koehne, 但按照记载与 *P. cerasoides* D. Don 在尼泊尔所记特征十分近似。因此作者同意 I. Ingram 意见二者合并为一,是否正确还有待今后考证。

36b. 红花高盆櫻桃(变种) 西府海棠(昆明)

**C. cerasoides** (D. Don) Sok. var. **rubea** (C. Ingram) Yü et Li, comb. nov. — *Prunus cerasoides* D. Don var. *rubea* C. Ingram in Gard. Chron. ser. 3, 122: 162. 1947; Sealy in Curtis's Bot. Mag. n. s. t. 12. 1948; Hara & Ohashi, Fl. E. Himal. 125. 1966. — *Prunus carmesina* Hara in Journ. Jap. Bot. 43:46, 1968; Hara & Ohashi in Fl. E. Himal. 2:54. 1971; Hara & Williams, Enum. Fl. Pl. Nepal 2:141. 1979.

高大乔木可达 30 米,叶片长圆卵形至长圆倒卵形,长约 10 厘米,宽 5 厘米,先端渐尖,叶边有单锯齿或重锯齿,下面中肋和细脉有长柔毛,花先叶开,伞形总状花序,有短总花梗,花 2—4 朵,直径约 2.9 厘米,花梗长 1—2.3 厘米,萼筒宽钟状,深红色,萼片三角形,先端圆钝,直立,深红色;花瓣倒卵形,先端全缘或微凹,深粉红色。花期 2—3 月。

产云南。海拔 1500—2000 米。尼泊尔、不丹、缅甸也有分布。本种在昆明常见栽培,花粉红色,近半重瓣,垂枝累累颇似北方的红色海棠花,因有西府海棠之称,可视为本变种的园艺品种。

37. 细齿櫻桃 云南櫻花(经济植物手册) 图版 12: 4—6