

圆形或宽楔形,边缘有贴生细锯齿,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,除沿中脉和脉腋有髯毛外,其余部分无毛,中脉和侧脉均明显突起;叶柄长 1.2—2.5 厘米,幼时被短绒毛,以后脱落无毛,无腺体,有时在叶片基部两侧各有 1 个腺体;托叶膜质,线状披针形,边缘有带腺锯齿,早落。总状花序直立,具多花,长 5—10 厘米,基部无叶,冬芽鳞片宿存;花梗长约 2 毫米,总花梗和花梗幼时被短绒毛,以后脱落;花直径 5—7 毫米;萼筒钟状,与萼片近等长或稍长;萼片三角状卵形,先端急尖,边有腺齿,萼筒与萼片外面无毛,内面被短柔毛;花瓣白色,近圆形或倒卵形,先端波状,基部有短爪;雄蕊 10,着生在花盘周围,与花瓣近等长;雌蕊 1,心皮无毛,柱头盘状,花柱比雄蕊短。核果近球形,顶端有短尖头,直径 7—8 毫米,黑色,果梗长约 8 毫米;萼片宿存。花期 4—5 月,果期 5—10 月。

产云南和四川西部。生于河谷两岸、山谷或溪边疏林中,以及杂木林内或林边荒地,海拔 2400—3200 米。模式标本采自四川西部。

本种和橐木 *P. buergeriana* (Miquel) Yü et Ku 极为近似,惟本种叶片质地较厚,长圆倒卵形或倒卵披针形,极稀椭圆形,下面沿中脉被柔毛;总状花序幼时被短绒毛,基部有宿存鳞片,可以区别。

组 2. 脱萼组——Sect. *Padus*——Sect. *Gymnopadus* Koehne in Abhand. Bot. Ver. Brandenburg 52: 107. 1910. p. p., et in Sarg. Pl. Wils. 1: 73. 1911. p. p.——Subsect. *Eupadus* Koehne in Abhand. Bot. Ver. Brandenburg 52: 107. 1911.

本组有下列 3 系。

系 1. 斑叶系——Ser. *Maackiopadus* (Koehne) Yü et Ku, stat. nov.——Subsect. *Maackiopadus* Koehne in Abhand. Bot. Ver. Brandenburg 52: 107. 1910, et in Sarg. Pl. Wils. 1: 75. 1911.

本系有下列 1 种。

4. 斑叶稠李(中国树木分类学) 山桃稠李(东北木本植物图志),山桃(东北)

*Padus maackii* (Rupr.) Kom. in Kom. & Klobukova-Alison, Key Pl. Far. East. Reg. URSS 2: 657. 1932, et Fl. URSS 10: 579. t. 97. f. 2. 1941.——*Prunus maackii* Rupr. in Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 15: 361. 1857; Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1: 73. 1911; Nakai, Fl. Sylv. Kor. 5: 17. t. 2. 1916; 陈嵘,中国树木分类学 483. 1937; 东北木本植物图志 321. 图版 111. 图 235. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 315. 图 2359. 1972; Kitagawa in Neo-Lineamenta Florae Manshuricae 377. 1979.——*Laurocerasus maackii* Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1: 645. f. 352 h-i. 1906.

4a. 斑叶稠李(原变型) 图版 16: 6—7

*P. maackii* (Rupr.) Kom. f. *maackii*