

55. 臭樱属*——*Maddenia* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. in Kew Journ. Bot. 6:381. t. 12. 1854; Benth.
et Hook. f. Gen. Pl. 1:610. 1865; Focke in Engler & Prantl. Nat.
Pflanzenfam. 3(3):51. 1888; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1:187. 1964.

落叶小乔木或灌木,冬芽大,卵圆形,具有多数鳞片。单叶互生;叶边有单锯齿、重锯齿或缺刻状重锯齿,齿尖有腺;托叶大形,显著,边有腺齿;花杂性异株,多花排成总状花序,稀有伞房花序者,着生在小枝顶端;苞片早落;花梗短;萼筒钟状,萼片短小,10—12裂,有时延长呈花瓣状;无花瓣;雄蕊20—40,着生在萼筒口部,排成紧密不规则2轮,在雄花里心皮1,具有短花柱,比雄蕊短很多,柱头头状;在两性花里心皮2,稀1,花柱细长,几与雄蕊等长或稍长,柱头盘状;胚珠2,并生,下垂。核果2,长圆形,微扁,肉质,紫色;核骨质,卵球形,急尖,有三棱,具有1成熟种子,种皮膜质;子叶平凸。

本属模式种:喜马拉雅臭樱 *Maddenia himalaica* Hook. f. et Thoms.

本属约6种,分布于喜马拉雅山区、尼泊尔、不丹和锡金。我国有5种,分布于中部和西部。

臭樱属分种检索表

1. 叶片下面无毛,小枝无毛或被柔毛。
 2. 小枝无毛,叶片下面白色并带白霜;边缘有不整齐锯齿或混有重锯齿;托叶草质,披针形,反折……
..... 1. 臭樱 *M. hypoleuca* Koehne
 2. 小枝有毛,叶片下面淡绿色,不具白霜,边缘有缺刻状重锯齿;托叶膜质……
..... 2. 锐齿臭樱 *M. incisoserrata* Yü et Ku
 1. 叶片下面密被柔毛或至少沿脉被柔毛;小枝密被柔毛。
 3. 小枝和叶片下面被柔毛或稍带棕色柔毛,边缘具有缺刻状重锯齿或重锯齿,齿有短尖头,但不带芒。
 4. 叶片下面仅沿脉被柔毛,其余部分无毛,边有重锯齿,齿呈窄披针形……
..... 3. 四川臭樱 *M. hypoxantha* Koehne
 4. 叶片下面被柔毛,沿叶脉更密,边有缺刻状锯齿……
..... 4. 华西臭樱 *M. wilsonii* Koehne
 3. 小枝、叶片下面和花序均密被棕褐色长柔毛,边缘有带芒重锯齿,营养枝上的叶片和花枝上叶片不同形……
..... 5. 喜马拉雅臭樱 *M. himalaica* Hook. f. et Thoms.
1. 臭樱 假稠李(中国高等植物图鉴)

Maddenia hypoleuca Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:56. 1911; Wils. in Journ. Arn.
Arb. 9:77. 1982; 中国高等植物图鉴 2: 317. 图 2364. 1977.

小乔木或灌木,高2—7米,多年生小枝紫褐色,有光泽,无毛,当年生小枝紫红色或带

* 属的异名: 假稠李属