

里兰卡、印度、印度尼西亚也有分布。模式标本采自香港。

茎皮含单宁,可提取栲胶;又可作外敷药用。

2. 长尾红叶藤 图版 26: 1—3, 7

Rourea caudata Planch. *Linnaea* **23**: 419. 1850; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **2**: 48. 1876. — *Santaloides caudatum* O. K. Ktze. *Rev. Gen. Pl.* **1**: 155. 1891; Schellenb. in *Engl. Pflanzenr. H.* **103**: 132. 1938.

藤本或攀援灌木,高3米,枝圆柱形,褐色,无毛或幼时被短绒毛。奇数羽状复叶,小叶7—9片,近纸质,小叶披针形或长圆披针形,长2.5—10厘米,宽0.8—3.5厘米,先端长尾尖,钝头,基部楔形,歪斜,全缘,上面光亮,下面中脉凸起,侧脉5—6对,网脉明显,未达边缘前即网结,小叶柄长3毫米,无毛。圆锥花序1—3在叶腋簇生,长达3.5—6厘米,被短绒毛;萼片卵形,长2.5毫米,宽1.8毫米,无毛;花瓣淡黄色,倒披针形至匙形,长6毫米,宽2毫米,有纵脉纹,无毛;雄蕊10,与萼片对生的5枚比与花瓣对生的5枚长;心皮5,离生。蓇葖果,淡绿色,干时深褐色,长1—2厘米,宽0.5—1厘米,弯曲或直,具宿存萼,长5毫米。种子长0.6—1.6厘米,宽0.4—0.9厘米,全部包以假种皮。

本种与小叶红叶藤 *Rourea microphylla* (Hook. & Arn.) Planch. 区别是小叶对数较少,叶片先端骤凸成长尾状,花序则较长,一般超过5厘米。

产广东、广西、云南。生于海拔800米以下山地疏林中。印度也有分布。模式标本采自印度。

3. 红叶藤 (海南植物志) 图版 26: 4—6

Rourea minor (Gaerth.) Leenh. in *Ven Steenis Fl. Males. ser. 1*, **5** (4): 514. 1957; Vidal in *Fl. Camb. Laos et Vietn* **2**: 34. 1962; Li. *Woody Fl. Taiwan* 329. f. 114. 1963. — *Aegiceras minus* Gaertn. *Fruct.* **1**: 216 t. 46. 1788. excl. syn. — *Rourea santaloides* Wight & Arn. *Prod. Fl. Penins.* **1**: 144. 1834; Benth. *Fl. Hongk.* 71. 1861; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **2**: 47. 1876; 陈焕镛等, *海南植物志* **3**: 112. 1974. — *Connarus roxburghii* Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 179. 1833. — *Rourea millettii*; Planchon, *Linnaea* **23**: 420. 1850. Merr. in *Lingn. Sci. Journ.* **5**: 88. 1927. — *Santaloides roxburghii* O. Ktze. *Rev. Gen.* **1**: 155. 1891; Schellenb. in *Engl. Pflanzenr. H.* **103**: 125. 1938.

藤本或攀援灌木,高达25米,枝圆柱形,深褐色,无毛或幼枝被疏短柔毛。奇数羽状复叶,连叶柄长4—23厘米,叶柄长1—7厘米,小叶片3—7片,通常3片,纸质,近圆形。卵圆形或披针形,顶端叶片稍大,卵圆形或长椭圆形,长3—12厘米,宽2—5厘米,先端急尖至短渐尖,基部阔楔形至圆形,两侧对称稍偏斜,全缘,上下两面均光滑,无毛,下面中脉突出,侧脉5—10对,网脉明显,未达边缘前即网结,小叶柄长5毫米,无毛。圆锥花序腋生,成簇,总梗3—6,长3—9厘米,无毛;花芳香,直径1厘米;萼片卵形,长2—3毫米,宽



1—3, 7. 长尾红叶藤 *Rourea caudata* Planch.: 1. 花枝, 2. 果枝, 3. 花, 7. 种子。4—6. 红叶藤 *Rourea minor* (Gaertn.) Leenh.: 4. 花枝, 5. 花, 6. 果。(王玢莹绘)