

Cylindrokelupha glabrifolia T. L. Wu in Acta Phytotax. Sin. **19**: 217. 1981.

——*Archidendron glabrifolium* (T. L. Wu) Nielsen in Acta Phytotax. Sin. **21**: 164. 1983.

乔木,高 2.5 米;小枝灰色,无毛。二回羽状复叶,羽片 2 对;总叶轴(连柄)长 8—15 厘米;羽片轴长 4—12 厘米;总叶轴及羽片轴均被微柔毛;总叶柄上、羽片及顶端 2 对小叶着生处的轴上均有圆形、略凸起的腺体;小叶 2—4 对,椭圆形或长圆形,长 5—14 厘米,宽 2—4.5 厘米,顶端渐尖或尾尖,基部楔形,不等侧,两面无毛,比较显著的侧脉 3—4 对;小叶柄长约 5 毫米。花未见。荚果肿胀,近圆柱形,长 13—18 厘米,宽约 3 厘米,直或微弯,熟时沿背腹两缝线开裂;种子 4 颗,短圆柱形,直径 2.2 厘米,高 8—15 毫米。果期 7 月。

产云南(勐海)。模式标本采自勐海。

4. 长叶棋子豆(植物分类学报)

Cylindrokelupha alternifoliolata T. L. Wu in Acta Phytotax. Sin. **19**: 219, pl.

9:3. 1981.——*Albizia alternifoliolata* (T. L. Wu) Y. H. Huang in Acta Bot. Yunnan.

5: 139. 1983.——*Archidendron alternifoliolatum* (T. L. Wu) Nielsen in Acta Phytotax. Sin. **21**: 164. 1983.

乔木,高 6 米;小枝棕色,被黄色短柔毛。二回羽状复叶;羽片 1 对;总叶柄长 2.5—6 厘米,中部以上有 1 枚凸起的圆形腺体;羽片轴长 10—13 厘米,被稀疏的短柔毛;小叶 3 对,除顶端 1 对小叶对生外,余互生,长圆形,长 7—15 厘米,宽 4—8 厘米,顶端渐尖,基部急尖,侧脉 4—5 对;小叶柄长 5—7 毫米。花 20 余朵组成头状花序,复再排成圆锥花序;花萼管状,长约 4 毫米,顶部具 5 短齿,疏被短柔毛;花冠管长约 5 毫米,裂片披针形,长约 4 毫米,被黄色短柔毛;雄蕊多数,花丝长 1.5 厘米,基部连合呈管状;子房无毛。荚果圆柱形,长 18—21 厘米,直径 4—5 厘米,熟时沿背腹两缝线开裂;种子短圆柱形,直径 3.5 厘米,高 2.8 厘米。果期 11 月。

产云南(屏边)。海拔 1500 米。

5. 大叶合欢(中国主要植物图说——豆科) 图版 17: 1—3

Cylindrokelupha turgida (Merr.) T. L. Wu in Acta Phytotax. Sin. **19**: 218.

1981.——*Pithecellobium turgida* Merr. in Philip. Journ. Sci. **15**: 239. 1919.——*Albizia*

turgida (Merr.) Merr. in Hu et Chun, Ic. Pl. Sin. **4**: 15, t. 165. 1935; Y. H. Huang

in Acta Bot. Yunnan. **5**: 137. 1983.——*A. croizatiana* Metc. in Lingnan Sci. Journ. **19**:

549. 1940.——*Paralbizzia turgida* (Merr.) Kosterm. in Bull. Org. Sci. Res. Indonesia

20(11): 23. 1954, et in Adansonia ser. 2, **6**: 362. 1966.——*Archidendron turgida*

(Merr.) Nielsen in Adansonia ser. 2, **19**: 32. 1979, et in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn.

19: 141. Pl. 26: 8—14. 1981, et in Acta Phytotax. Sin. **21**: 167. 1983.——*Albizia*

lucida auct. non Benth.: Merr. in Lingnan Sci. Journ. **7**: 309. 1929.

小乔木,高 4—9 米,嫩枝、叶轴密被锈色绒毛。二回羽状复叶,羽片 1 对;总叶柄近顶,