

乔木,高8—10米。小枝被锈色短柔毛,皮孔显著。二回羽状复叶;总叶柄近基部及羽片轴近顶部有1枚椭圆形腺体;叶轴被短柔毛;羽片2—4对;小叶4—6对,椭圆形、卵形或倒卵形,长2—7厘米,宽1.5—4厘米,先端圆钝,基部斜截平,上面无毛,下面被短柔毛;中脉居中,两侧稍不对称;小叶柄长2毫米。花白色,无梗,7—10朵聚成头状,再排成圆锥花序;总花梗长2.5—3.5厘米,密被短柔毛;花萼杯状,长1毫米,顶具5短齿;花冠与花萼同密被淡黄色或白色茸毛,花冠管长3.5毫米,裂片三角状卵形,长2.5毫米;雄蕊约25枚,花丝长2.5厘米,基部连合成长约5毫米的管。荚果带状,长15—22厘米,宽约3.5厘米,薄,无毛;种子8—11颗。花期8月;果期11月。

产云南、广西;生于疏或密林中。泰国、缅甸和越南亦有分布。

6. 海南合欢(海南植物志) 刘氏合欢(中国主要植物图说——豆科)

Albizia attopuensis (Pierre) Nielsen in *Adansonia* ser. 2, **19**(2): 209. 1979, et in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. **19**: 77. 1981. — *Pithecellobium attopuense* Pierre, Fl. For. Cochinch. Pl. 396A. 1899; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 99. 1913. — *Albizia laui* Merr. in Lingnan Sci. Journ. **14**: 7. fig. 1. 1935; Chun et How in Acta Phytotax. Sin. **7**: 17. 1958; 陈焕镛等,海南植物志 **2**: 208. 1965. — *Serialbizzia attopuense* (Pierre) Kosterm. in Commun. Forest Res. Inst. **54**: 8. 1956, et in *Adansonia* ser. 2, **6**(3): 361. 1966. — *Albizia attopuensis* (Pierre) Nielsen var. *laui* (Merr.) Nielsen, *op. cit.* 210. — *Albizia attopuensis* (Pierre) T. L. Wu in Acta Phytotax. Sin. **19**: 220. 1981.

落叶乔木,高约10米,小枝上有显著的皮孔。二回羽状复叶;羽片1对,长10—15厘米,小叶及羽片着生处均有腺体;小叶2—4对,很少1对,革质或近革质,长圆形或长卵形,长5—10厘米,宽2.5—5.5厘米,先端渐尖,基部近圆形至阔楔形,稍不等侧,仅下面脉上被微柔毛,网脉两面均凸起;小叶柄长5—7毫米,被短绒毛。头状花序有花数至10余朵,再排成圆锥花序,被锈色短柔毛;总花梗长5—25毫米;花淡黄色,芳香,无梗;花萼管状,长2—2.5毫米,裂齿短,卵状三角形,外面密被短柔毛;花冠漏斗状,长8—10毫米,裂片长圆形;雄蕊30—40枚,花丝长约3厘米,基部合生成管;子房线形,长约3.5毫米。荚果长圆形,长10—15厘米,宽3—4厘米,扁平,无毛,不裂;种子9—12颗,椭圆形,黑褐色。花期2—6月;果期6—10月。

产海南。生于林中。越南、老挝亦有分布。

7. 香合欢(海南植物志) 香茜藤(海南),香须树(中国高等植物图鉴),黑格(广东)

Albizia odoratissima (Linn. f.) Benth. in London Journ. Bot. **3**: 88. 1844; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 299. 1878; 陈焕镛等,海南植物志 **2**: 209. 1965; 中国高等植物图鉴 **2**: 322. 1972. — *Mimosa odoratissima* Linn. f. Suppl. 437. 1781. — *Albizia kalkora* auct. non Prain: Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 88. 1927.