

珠多颗。荚果扁平,长 8—15 厘米,宽 1—2 厘米,紫褐色,沿腹缝线具狭翅,翅宽 3—5 毫米;种子 14—18 颗,淡褐色。

产广西(隆林、田林、德保)和云南(景东、西双版纳、河口)。生于海拔 1000—1200 米,疏林中。老挝、泰国、缅甸、印度、斯里兰卡和印度尼西亚也有分布。

4. 盾柱木属 *Peltophorum* (Vogel) Benth., nom. cons.

Benth. in Hook. Journ. Bot. **2**: 75. 1840; Hutch. Gen. Fl. Pl. **1**: 262.

1964. — *Caesalpinia* sect. *Peltophorum* Vogel in Linnaea **11**: 406.

1837. — *Baryxylum* Lour. Fl. Cochinch. 266. 1790, nom. rejic.

落叶乔木,无刺。叶为大型二回偶数羽状复叶;羽片对生;小叶多数,对生,无柄。圆锥花序或总状花序腋生或顶生;苞片小,脱落或宿存;无小苞片;花两性,黄色,美丽,具花盘;花托短;萼片 5;近相等;花瓣 5 片,与萼片均为覆瓦状排列;雄蕊 10 枚,离生,花丝稍伸出花冠外,基部密被簇状粗毛,花药长圆形,背着;子房无柄,与花托离生,有 3—8 颗胚珠,花柱长,柱头大,盾状、头状或盘状。荚果披针状长圆形,扁平,薄而坚硬,不开裂,沿背腹两缝线均有翅;种子 2—8 颗,扁平,无胚乳。

属模式种: *P. nogeleianum* Benth. (*P. dubium* (Spreng.) Taub.)

全世界约 12 种。分布于斯里兰卡、安达曼和马来群岛以及大洋洲南部等热带地区。我国产 1 种,引种 1 种。

盾柱木属分种检索表

- 1 花梗与花蕾几乎等长;托叶全缘;圆锥花序;柱头 3 裂;荚果成熟后全部有条纹..... 1. 盾柱木 *P. pterocarpum* (DC.) Baker ex K. Heyne
- 1. 花梗为花蕾 1—2 倍长;托叶分裂;总状花序;柱头不分裂;荚果成熟后在中部无条纹..... 2. 银珠 *P. tonkinense* (Pierre) Gagnep.

1. 盾柱木(广州植物志) 双翼豆(中国主要植物图说——豆科) 图版 31:1—7

Peltophorum pterocarpum (DC.) Baker ex K. Heyne, Nutt. Pl. Ned. Ind. ed. 2, **2**: 755. 1927. — *Inga pterocarpa* DC. Prodr. **2**: 441. 1825. — *Poinciana roxburghii* G. Don, Gen. Syst. **2**: 433. 1832. — *Caesalpinia inermis* Roxb. Hort. Beng. 90. 1814, Fl. Ind. ed. 2, **2**: 367. 1832. — *Peltophorum inerme* (Roxb.) Naves in Blanco, Fl. Filip. ed. 3, pl. 335, ex F. Vill. Nov. App. 69, pro syn. 1884; 侯宽昭等, 广州植物志 316. 1956. — *P. ferrugineum* Benth. Fl. Austr. **2**: 279. 1864; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 192. 1913.