

## 5. 凤凰木属 *Delonix* Raf.

Raf. Fl. Tellur. 2: 92. 1836.

高大乔木，无刺。大型二回偶数羽状复叶，具托叶；羽片多对；小叶片小而多。伞房状总状花序顶生；花两性，大而美丽，白色、橙色和鲜红色；苞片小，早落；花托盘状或陀螺状；萼片5，倒卵形，近相等，镊合状排列；花瓣5，与萼片互生，圆形，具柄，边缘皱波状；雄蕊10枚，离生，下倾；子房无柄，有胚珠多颗，花柱丝状，柱头截形。荚果带形，扁平，下垂，2瓣裂，果瓣厚木质，坚硬；种子横长圆形。

属模式种：*D. regia* (Boj.) Raf.

全世界2—3种。分布于非洲东部、马达加斯加至热带亚洲。我国引种栽培1种，见于广东、广西、云南、福建和台湾等省区。

1. 凤凰木(广州) 凤凰花、红花楹(广州)、火树

*Delonix regia* (Boj.) Raf. Fl. Tellur. 2: 92. 1836; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 90. 1927, et 6: 93. 1928; 中国主要植物图说——豆科 85, 图 85. 1955; 侯宽昭等, 广州植物志 316, 图 170. 1956; 中国高等植物图鉴 2: 348, 图 2426. 1980. ——*Poinciana regia* Boj. ex Hook. in Curtis's Bot. Mag. t. 2884. 1826; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 171. 1913.

高大落叶乔木，无刺，高达20余米，胸径可达1米；树皮粗糙，灰褐色；树冠扁圆形，分枝多而开展；小枝常被短柔毛并有明显的皮孔。叶为二回偶数羽状复叶，长20—60厘米，具托叶；下部的托叶明显地羽状分裂，上部的成刚毛状；叶柄长7—12厘米，光滑至被短柔毛，上面具槽，基部膨大呈垫状；羽片对生，15—20对，长达5—10厘米；小叶25对，密集对生，长圆形，长4—8毫米，宽3—4毫米，两面被绢毛，先端钝，基部偏斜，边全缘；中脉明显；小叶柄短。伞房状总状花序顶生或腋生；花大而美丽，直径7—10厘米，鲜红至橙红色，具4—10厘米长的花梗；花托盘状或短陀螺状；萼片5，里面红色，边缘绿黄色；花瓣5，匙形，红色，具黄及白色花斑，长5—7厘米，宽3.7—4厘米，开花后向花萼反卷，瓣柄细长，长约2厘米；雄蕊10枚；红色，长短不等，长3—6厘米，向上弯，花丝粗，下半部被绵毛，花药红色，长约5毫米；子房长约1.3厘米，黄色，被柔毛，无柄或具短柄，花柱长3—4厘米，柱头小，截形。荚果带形，扁平，长30—60厘米，宽3.5—5厘米，稍弯曲，暗红褐色，成熟时黑褐色，顶端有宿存花柱；种子20—40颗，横长圆形，平滑，坚硬，黄色染有褐斑，长约15毫米，宽约7毫米。 花期6—7月，果期8—10月。

原产马达加斯加，世界热带地区常栽种。我国云南、广西、广东、福建、台湾等省栽培。

本种在我国南方城市的植物园和公园栽种颇盛，作为观赏树或行道树。树冠扁圆而

开展，枝叶密茂，花大而色泽鲜艳，盛开时红花与绿叶相映，色彩夺目，特别艳丽，故名凤凰木。

树脂能溶于水，用于工艺；木材轻软，富有弹性和特殊木纹，可作小型家具和工艺原料。种子有毒，忌食。

### 6. 云实属<sup>1)</sup> *Caesalpinia* Linn.

Linn. Sp. Pl. 380. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 178. 1754; Hattink in Reinwardtia 9: 9. 1974; Vidal et Hui Thol in Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 395 (Bot. 27): 71. 1976. —— *Guilandina* Linn. Sp. Pl. 381. 1753, Gen. Pl. ed. 5, 179. 1954. —— *Mezoneuron* Desf. in Mem. Mus. Hist. Nat. Paris 4: 245. 1818 ('Mezonevron').

乔木、灌木或藤本，通常有刺。二回羽状复叶；小叶大或小。总状花序或圆锥花序腋生或顶生；花中等大或大，通常美丽，黄色或橙黄色；花托凹陷；萼片离生，覆瓦状排列，下方一片较大；花瓣5片，常具柄，展开，其中4片通常圆形，有时长圆形，最上方一片较小，色泽、形状及被毛常与其余四片不同；雄蕊10枚，离生，2轮排列，花丝基部加粗，被毛，花药卵形或椭圆形，背着，纵裂；子房有胚珠1—7颗，花柱圆柱形，柱头截平或凹入。荚果卵形、长圆形或披针形，有时呈镰刀状弯曲，扁平或肿胀，无翅或具翅，平滑或有刺，革质或木质，少数肉质，开裂或不开裂；种子卵圆形至球形，无胚乳。本属染色体 $2n = 24$ 。

属模式种：*C. brasiliensis* Linn.

约100种。分布热带和亚热带地区。我国产17种，除少数种分布较广外，主要产地在南部和西南部。

#### 云实属分种检索表

1. 荚果不具翅或具狭翅，翅宽不超过5毫米(亚属1. 云实亚属 Subgen. *Caesalpinia*)

2. 荚果非肉质。

3. 荚果表面有刺或有刚毛。

4. 荚果长圆形，表面有刺。

5. 托叶大，叶状，深裂或分裂；苞片锥状；花瓣黄色；荚果长5—7厘米，宽4—5厘米，宽接近于长；种子近球形……………1. 刺果苏木 *C. bonduc* (Linn.) Roxb.

5. 托叶锥状；苞片椭圆形；花瓣白色，具紫红色斑点；荚果长7.5—13厘米，宽4—4.5厘米；种子圆柱形……………2. 噪英云实 *C. minax* Hance

1) 属的异名：苏木属(中国树木分类学)