

种子入药,名石莲子,性寒无毒,开胃进食,清心介烦,除湿去热,治嘔逆不止,淋浊。

3. 含羞云实(新拟) 图版 33:1—6

Caesalpinia mimosoides Lam. Encycl. **1**: 462. 1785; DC. Prodr. **2**: 482. 1825; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**: 256. 1878.

木质藤本;小枝密被锈色腺毛和倒钩刺。二回羽状复叶长 22—36 厘米;羽片对生,13—23 对,长约 3.5 厘米;小叶对生,7—14 对,长约 9 毫米,宽约 4 毫米,边缘和下面有刚毛。总状花序顶生;花大,排列疏松,多达 50 朵以上;花梗不等长,上部的长 1.5—2 厘米,下部的长 3—3.5 厘米;花托凹;萼片 5,长约 10 毫米,宽约 8 毫米;花瓣 5,鲜黄色,近圆形,其中 4 片较大,长约 17 毫米,宽约 13 毫米,上面一片较小,宽约 8 毫米;雄蕊 10 枚,花丝长约 18 毫米,下部密被绵毛;子房长约 5 毫米,密被毛,花柱长 14—15 毫米,疏被毛,柱头截平,有短褐毛。荚果倒卵形,呈镰刀状弯曲,长约 4.5 厘米,宽约 2.5 厘米,表面有刚毛,开裂;种子 1—2 颗,长圆形。花期 11—12 月;果期翌年 2—3 月。

产云南西双版纳。生于路旁灌丛,海拔 600—700 米。印度(模式标本采自印度西部)和缅甸也有分布。

小枝的腺毛有臭味,云南傣族称之为臭菜。枝、叶嫩尖在开水中烫数分钟后炒吃,味略带酸涩,富含维生素。

4. 小叶云实(中国主要植物图说——豆科) 图版 33:7—8

Caesalpinia millettii Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 182. 1883; 中国主要植物图说——豆科 89, 图 88. 1955. — *Pterolobium subvestitum* Hance in Journ. Bot. **22**: 365. 1884.

有刺藤本,各部被锈色短柔毛。叶长 19—20 厘米;叶轴具成对的钩刺;羽片 7—12 对;小叶 15—20 对,互生,长圆形,长 7—13 毫米,宽 4—5 毫米,先端圆钝,基部斜截形,两面被锈色毛,下面较密。圆锥花序腋生,长达 30 厘米;花多数,上部稠密,下部稀疏;花梗长 15 毫米,被稀疏短柔毛;花托凹陷;萼片 5,最下面一片长达 8 毫米,其余的长约 5 毫米;花瓣黄色,近圆形,宽约 8 毫米,最上面一片较小,只有 4 毫米宽,基部有柄;雄蕊长约 1 厘米,花丝下部被长柔毛;雌蕊较雄蕊略长,长约 13 毫米,子房与花柱下部被柔毛,柱头截平,有短毛。荚果倒卵形,背缝线直,具狭翅,被短柔毛,革质,无刺,成熟时沿背缝线开裂;种子 1 颗,肾形,红棕色,长约 11 毫米,宽约 6 毫米,有光泽,具环纹。花期 8—9 月;果期 12 月。

产广东、广西、湖南南部和江西南部。生于山脚灌丛中或溪水旁。

5. 大叶云实(中国主要植物图说——豆科)

Caesalpinia magnifoliolata Metc. in Lingnan Sci. Journ. **19**: 533. 1940; 中国主要植物图说——豆科 90, 图 89. 1955——*C. yaoshanensis* Chun ined.

有刺藤本;小枝被锈色短柔毛;二回羽状复叶有羽片 2—3 对;小叶 4—6 对,革质,长



1—6.含羞云实 *Caesalpinia mimosoides* Lam.: 1.花序, 2.果枝, 3.花瓣, 4.雄蕊和雌蕊, 5.萼片, 6.开裂的果示种子。(宗维诚绘) 7—8.小叶云实 *Caesalpinia millettii* Hook. et Arn.: 7.枝叶, 8.果。(陶德圣绘)