

形或椭圆状长圆形,长10—14厘米,宽3—3.5厘米,红棕色,光滑,沿腹缝线具翅,翅宽5—6毫米;种子3—7颗,卵圆形,中央有隆起的脊。花期9—10月;果期10月至翌年2月。

产云南和广西的南部、西南部。生于海拔600米的山坡、山脚灌丛或疏林中。印度、缅甸、斯里兰卡、马来西亚等地有分布。

17. 膜荚见血飞 图版 37:6—10

Caesalpinia hymenocarpa (Prain) Hattink in Reinwardtia 9: 35. 1974; Vidal et Hul Thol in Bull. Mus. Nat. Hist. Paris 395 (Bot. 27): 97. 1976. — *Mezoneurum hymenocarpum* Wight et Arn. Prodr. 283. 1834, nom. nud. — *Mezoneuron hymenocarpum* Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal 66 (2): 233. 1897; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 194. 1913.


藤本;枝疏被黄色柔毛,散生黄褐色的钩刺。二回羽状复叶互生;叶轴长20—30厘米;羽片8—10对,对生;羽轴长8—10厘米,与叶轴同被黄色柔毛;小叶5—6对,长圆形,长1.5—2厘米,宽约1厘米,先端圆钝,基部阔楔形,上面深绿色,下面黄绿色,两面均被黄色长柔毛;小叶柄短,基部具对生、下弯的托叶刺。总状花序或圆锥花序长30—50厘米,腋生或顶生;花梗长1—1.5厘米;苞片披针形,先端长渐尖,黄褐色,密被黄色柔毛;花托盘状;萼片5,外面均被黄色柔毛,下面一片盔状,其余的长圆形,花瓣5片,黄色,上面一片具柄,圆形,侧面两片较小,下面一片对折凸起;雄蕊10枚,花丝下半部膨大,密被褐色长柔毛,不等长,弯曲,花药椭圆形;子房光滑,有胚珠5—7枚,花柱往下逐渐膨大,柱头啮蚀状。荚果扁平而薄,镰刀状,成熟时长10—15厘米,宽约2.5厘米,沿腹缝线具翅,翅宽约1厘米;种子5—7颗,长卵形,扁平。花期9—10月;果期12月至翌年2月。

产云南和广西(百色)。生于海拔280—350米的疏林及湿地。泰国、越南、斯里兰卡有分布。

7. 老虎刺属 **Pterolobium** R. Br. ex Wight et Arn., nom. cons.

R. Br. ex Wight et Arn. Prodr. 283. 1834; Vidal et Hul Thol in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 227 (Bot. 15): 2. tab. 1—4. 1974. — *Canthuffa* J. F. Gmel. Syst. 2: 677. 1791. — *Reichardia* Roth, Nov. Pl. Sp. 210. 1821. prim.

高大攀援灌木或木质藤本;枝具下弯的钩刺。二回偶数羽状复叶互生;羽片和小叶片多数;托叶与小托叶小或不明显,早落。总状花序或圆锥花序腋生或顶生于枝顶部;苞片钻形至线形,极早脱落;花小,白色或黄色,无小苞片;花托盘状;萼片5,最下面的一片较大,微凹,舟形;花瓣5片,开展,长圆形或倒卵形,略不等,与萼片均为覆瓦状排列,最上面的



1—5.九羽见血飞 *Caesalpinia enneaphylla* Roxb.: 1.果枝, 2.花瓣, 3.雄蕊及雌蕊, 4.雌蕊, 5.雄蕊腹、背面。6—10.膜荚见血飞 *Caesalpinia hymenocarpa* (Prain) Hattink: 6.花枝, 7.花蕾, 8.果枝, 9.小叶腹、背面, 10.嫩枝放大示毛被。(邓晶发绘)