

效,可治产后血气痛、疔疮肿毒、喉痹;花可治风湿筋骨痛。

4b. 白花紫荆(变型)(植物分类学报)

f. *alba* Hsu in Acta Phytotax. Sin. 11: 193. 1966.

花白色。

产江苏上海(复旦大学校园内有栽培)。

4c. 短毛紫荆(变型)(广西植物)

pubescens Wei in Guihaia, 3:15. 1983.

灌木,高2—3米。幼枝、叶柄以及叶下面沿脉上均被短柔毛。

产江苏、浙江、安徽、湖北、贵州和云南。通常栽培。

5. 黄山紫荆(中国树木分类学) 秦氏紫荆(中国植物图谱) 图版48:8—9

Cercis chingii Chun in Journ. Arn. Arb. 8: 20. 1927; Rehd. & Wils. in Journ. Arn. Arb. 8: 127. 1927; Chun in Icon. Pl. Sinic. Fasc. 2: Pl. 82. 1929, et in Sunyatsenia 1:253. 1934; 陈嵘, 中国树木分类学, 522. 1937; H. L. Li in Bull. Torrey Bot. Club 71: 424. 1944.

丛生灌木,高2—4米;主干和分枝常呈披散状;小枝初时灰白色,干后呈黑褐色,有多而密的小皮孔,嫩时被棕色短柔毛。叶近革质,卵圆形或肾形,长5—11厘米,宽5—12厘米,先端急尖而成一长5—8毫米的尖头,或圆钝而无尖头,基部心形或截平,干后下面常呈棕色,且基部脉腋间或沿主脉上常被短柔毛,主脉5条,下面凸起;叶柄长1.5—3厘米,两端微膨大。花常先叶开放,数朵簇生于老枝上,淡紫红色,后渐变白色;花萼长约6毫米;花瓣长约1厘米。荚果厚革质,长7—8.5厘米,宽约1.3厘米,无翅和果颈,喙粗大,长约8毫米,粗达2毫米,坚硬,二瓣裂,果瓣常扭曲;种子3—6颗,嵌入一厚而微白(干后呈棕褐色)之海绵状组织内。花期2—3月;果期9—10月。


产安徽、浙江和广东北部。生于低海拔山地疏林灌丛,路旁或栽培于庭园中。模式标本采自安徽。

15. 羊蹄甲属 *Bauhinia* Linn.

Linn. Sp. Pl. 374. 1753; Taub. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam.

3(3): 147. 1892; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 242. 1964.

乔木,灌木或攀援藤本。托叶常早落;单叶,全缘,先端凹缺或分裂为2裂片,有时深裂达基部而成2片离生的小叶;基出脉3至多条,中脉常伸出于2裂片间形成一小芒尖。花两性,很少为单性,组成总状花序,伞房花序或圆锥花序;苞片和小苞片通常早落;花托短陀螺状或延长为圆筒状;萼杯状,佛焰状或于开花时分裂为5萼片;花瓣5片,略不等,常具瓣柄;能育雄蕊10、5或3枚,有时2或1枚,花药背着,纵裂,很少孔裂;退化雄蕊(或



1—4. 垂丝紫荆 *Cercis racemosa* Oliv.: 1. 果枝 2. 花序, 3. 花, 4. 花除去花瓣示雄蕊和雌蕊。
 5—7. 紫荆 *Cercis chinensis* Bunge: 5. 叶 6. 花枝一部分, 7. 果。
 8—9. 黄山紫荆 *Cercis chingii* Chun: 8. 叶, 9. 果。
 10—11. 湖北紫荆 *Cercis glabra* Pampan.: 10. 花枝, 11. 果。(邓盈丰绘)