

无毛,花柱短,内弯,柱头小。荚果扁而薄,半椭圆形或长圆形,长2—7厘米,宽1.5—2厘米,具纤细的果颈及宿存萼,果瓣薄革质,无毛。

产云南(宾川、禄劝、凤庆)。

15. 阔裂叶羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科) 亚那藤(广东大埔),搭袋藤(广东从化) 图版 58:1—7

Bauhinia apertilobata Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 16: 83. 1937; L. Chen in Lingnan Sci. Journ. 18: 481. 1939; 中国主要植物图说——豆科 57, 图 54. 1955。——*B. championii* Benth. var. *apertilobata* (Merr. et Metc.) Hiroe, Pl. Basho's et Buson's Hokku Lit. 8: 346. 1973, syn. nov.

藤本,具卷须;嫩枝、叶柄及花序各部分均被短柔毛。叶纸质,卵形、阔椭圆形或近圆形,长5—10厘米,宽4—9厘米,基部阔圆形,截形或心形,先端通常浅裂为2片短而阔的裂片,罅口极阔甚或成弯缺状,嫩叶先端常不分裂而呈截形,老叶分裂可达叶长的1/3或更深裂,裂片顶圆,上面近无毛或疏被短柔毛,下面被锈色柔毛,有时渐变秃净;基出脉7—9条。伞房式总状花序腋生或1—2个顶生,长4—8厘米,宽4—7厘米;苞片丝状,长3.5—7毫米;小苞片锥尖,着生于花梗中部;花梗长18—22毫米;花蕾椭圆形,略具凸头;花托短漏斗状;萼裂片披针形,开花时下反;花瓣白色或淡绿白色,具瓣柄,近匙形,外面中部被毛;能育雄蕊3,花丝长6—9毫米,无毛;子房具柄,仅于两缝线被黄褐色丝质长柔毛。荚果倒披针形或长圆形,扁平,长7—10厘米,宽3—4厘米,顶具小喙,果瓣厚革质,褐色,无毛;种子2—3颗,近圆形,扁平,直径15毫米。花期5—7月;果期8—11月。

产福建、江西、广东、广西。生于海拔300—600米的山谷和山坡的疏林、密林或灌丛中。模式标本采自广东大埔县。

本种与龙须藤 *B. championii* (Benth.) Benth. 在外形上虽有些近似,但该种的总状花序狭长,非伞房式,长可达20厘米;苞片小,锥尖;叶全缘或分裂,罅口狭,易于区别。

16. 龙须藤(广东) 菊花木、五花血藤、圆龙、蛤叶、乌郎藤、罗亚多藤(广东),百代藤(广东海南);乌皮藤、搭袋藤(广西),钩藤(湖南、台湾)、田螺虎树(江西、植物名实图考)

Bauhinia championii (Benth.) Benth. Fl. Hongk. 99. 1861; Hance in Journ. Bot. 21: 298. 1883; L. Chen in Lingnan Sci. Journ. 18: 276. 1939; 中国主要植物图说——豆科 52, 图 47. 1955; 陈焕镛等, 海南植物志 2: 221. 1965。——*Phanera championii* Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 4: 78. 1852。——*B. hunanensis* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 541. 1933。——*B. championii* var. *acutifolia* L. Chen, op. cit. 278.

16a. 龙须藤(原变种) 图版 58:8—15

var. **championii**

藤本,有卷须;嫩枝和花序薄被紧贴的小柔毛。叶纸质,卵形或心形,长3—10厘米,宽2.5—6.5(—9)厘米,先端锐渐尖、圆钝、微凹或2裂,裂片长度不一,基部截形、微凹或



1—7. 阔裂叶羊蹄甲 *Bauhinia apertilobata* Merr.: 1. 花枝, 2. 花, 3. 萼片, 4. 花瓣, 5. 雄蕊, 6. 雌蕊, 7. 叶片先端。8—15. 龙须藤 *Bauhinia championii* (Benth.) Benth.: var. *Championii* 8. 花枝, 9. 花, 10. 萼片, 11. 花瓣, 12. 能育雄蕊和假雄蕊, 13. 雌蕊, 14. 果, 15. 叶片的各式不同形状的先端。(邓晶发绘)