

形,长约2厘米;萼裂片略厚,线状披针形,长2.5—3厘米,宽约3厘米,先端长渐尖,外面被茸毛;花瓣近革质,白色;基部红色,外面密被褐色丝质柔毛,内面被极稀疏柔毛,瓣柄长达2厘米,瓣片阔倒卵形,长约3厘米,宽约2.2厘米,上部有隆起的脉,顶凹缺;能育雄蕊3,花丝粗,直径1.5毫米,长约3.5厘米,无毛,花药具极稀疏的柔毛;不育雄蕊2,花丝纤细,长约1.5厘米,无毛;子房具柄,密被赤褐色柔毛,花柱粗,柱头阔,盘状,直径约4毫米。荚果未见。花期9月。

产云南南部(西双版纳大勐龙)。

本种以其花具长的萼裂片,花瓣近革质,外面密被丝质柔毛,易于同本属其他各种区别。

《云南植物名录》(1984)上册550页记载 *Bauhinia griffithiana* (Benth.) Prain 亦产于云南,所根据的标本是采自西双版纳大勐龙的王启无78485,它正是本种的模式标本。据 *B. griffithiana* 的原始描述:“叶圆形,直径6.5—10厘米,先端分裂达1/3,罅口狭;托叶圆形,叶状,直径达2厘米,宿存;花蕾棒状,长约2.5厘米;苞片卵形,长7.5毫米,宽6毫米,近宿存”。以上特征只有花蕾棒状,与本种的相同。从本种的原始记载及同号模式标本来看,叶为广卵形(非圆形),长略大于宽,叶分裂只达叶长的1/5—1/4,罅口阔。标本上未见有托叶及苞片(可能是早落)。这些特征与 *B. griffithiana* 的不符。由于我们未见到 *B. griffithiana* 的马来西亚标本,故本志暂不将此种列入。

22. 绯红羊蹄甲(新拟)

Bauhinia coccinea (Lour.) DC. Prodr. 2: 516. 1825; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. n.s. 24(2): 188. 1935, et in Journ. Arn. Arb. 23: 170. 1942. — *Phanera coccinea* Lour. Fl. Cochinch. 37. 1790.

22a. 绯红羊蹄甲(原亚种)

subsp. *coccinea*

产越南中部和老挝南部,我国不产。

22b. 越南红花羊蹄甲(亚种) 图版55:7—11

subsp. *tonkinensis* (Gagnep.) K. et S. S. Larsen in Aubrev. Camb. Laos Vietn. 18: 201. 1980. — *B. ferruginea* Roxb. var. *tonkinensis* Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2:126. 1913.

木质藤本;枝粗壮,初时被锈色绒毛,渐变无毛;卷须无毛。叶革质,长圆形,长5.5—8厘米,宽3—5厘米,先端凹入或分裂达叶长的1/6,裂片急尖而钝头或狭圆,基部通常截平,很少呈心形,成长时两面无毛,上面有光泽;基出脉9条,在叶面稍凹陷,在下面明显凸起;托叶近圆形,直径4—5毫米;叶柄纤细,长15—30毫米,无毛。伞房花序式的总状花序密被锈色茸毛,长9—12厘米;苞片披针形,兜状,长10—12毫米,宽6—7毫米;花稍大,密集;花梗长25—30毫米,密被毛;花蕾椭圆形,长15—18毫米,被锈色绒毛;花托圆