

花瓣金黄色。花期7月。

产云南(河口)。

26. 少脉羊蹄甲 图版 60:7—13

*Bauhinia paucinervata* T. Chen in *Guihaia* 8:46. 1988.

木质藤本;幼枝和叶柄被灰褐色短茸毛,渐变无毛;卷须少。叶革质,全缘,卵形至披针形,长4.6—10厘米,宽2.5—5(—6)厘米,先端渐尖,基部圆形,两面无毛,有光泽;基出脉3—5条,与网脉在两面清晰凸起;叶柄纤细,长0.8—3厘米,初时被灰色或淡褐色短茸毛,变秃净。伞房花序式的总状花序常复合成9—10厘米,宽5—7厘米的圆锥花序,腋生和顶生,多花,被灰褐色短茸毛;苞片披针形,长2.5—3毫米,渐尖,外面被毛;小苞片钻状,长1—1.5毫米,着生于花梗中部以上;花梗纤细,长8—15毫米,被毛;花蕾阔椭圆形,长约4毫米,宽约3毫米;萼片5,披针形,其中2片合生,长约2.5毫米,外面被毛,花后不反折;花瓣白色,倒卵形,长4—5毫米(包括长约1毫米的瓣柄),宽2.5—3毫米,边缘皱波状,外面密被黄褐色丝质长柔毛,但边缘无毛;能育雄蕊3枚,花丝无毛,长5—7毫米;退化雄蕊7枚;花盘不显著,非肉质;子房具短柄,完全无毛,偏生于花盘一侧,花柱纤细,比子房柄长,柱头小,头状。荚果长圆形至带状,扁平,长9—11厘米,宽3—3.5厘米,有种子3—4颗,果瓣硬木质,干时褐色,无毛;种子椭圆形,扁平,长12—18毫米,宽9—14毫米。花期6—8月;果期10月。


本种与产缅甸和马来西亚的 *B. glabrifolia* (Benth.) Baker 近似,区别为叶不分裂,基出脉较少(该种的叶有基出脉7—9条);子房无毛。

产广西西部(龙州、上金)。生于海拔300—600米的石灰岩山上灌丛中。模式标本采自广西龙州县。

27. 海南羊蹄甲(海南植物志) 图版 61:8—10

*Bauhinia hainanensis* Merr. et Chun ex L. Chen in *Journ. Arn. Arb.* 19: 132. 1938, et in *Lingnan Sci. Journ.* 18:272. 1939; 陈焕镛等,海南植物志 2:220. 1965. — *B. megacarpa* L. Chen in *Journ. Arn. Arb.* 20: 438. 1965.

木质藤本;幼嫩部分和花序均密被锈色茸毛;卷须粗壮,单生于上部叶腋,被毛。叶近革质,近圆形或卵圆形,长10—18厘米,宽10—20厘米,上部分裂达叶长的 $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ ,裂片先端圆钝,内侧常彼此覆盖,基部深心形,上面除基部外无毛,下面薄被锈色疏柔毛,脉上较密;基出脉11—13条,网脉细而密;叶柄长3—8厘米,密被紧贴的锈色短柔毛。圆锥花序常呈伞房状,长约13厘米;花芳香,直径约1.5厘米;花梗长10—15毫米,中部具2枚近对生的小苞片,与萼同被锈色短茸毛;花托漏斗状,长约3毫米;萼裂片广卵形,急尖,长约6毫米;花瓣粉红近白色,阔倒卵形,长8—9毫米,边缘皱折,基部具长约1毫米的短柄,内面近无毛,外面密被锈色柔毛;能育雄蕊3枚,花丝无毛,长约25毫米;退化雄蕊2枚,长约7毫米;花盘肉质;子房具柄,无毛,花柱细长,柱头头状。荚果木质,长圆形,扁



1—6. 小巧羊蹄甲 *Bauhinia venustula* T. Chen: 1.花枝, 2.花, 3—5.花瓣, 6.雌蕊。  
 7—13. 少脉羊蹄甲 *Bauhinia paucinervata* T. Chen: 7.花枝, 8—10.花瓣腹面观, 11.花瓣  
 背面观, 12.雌蕊, 13.果。(余汉平绘)