

1 厘米,具 5 毫米长的瓣柄,外面被粗毛,内面仅沿瓣柄被毛;能育雄蕊 3,花丝长约 2 厘米,基部被柔毛;退化雄蕊 2—3,子房被粗毛,近无柄,花柱长 6—7 毫米,基部被毛,柱头盾状。荚果倒披针状长圆形,扁平,长 10—18 厘米,宽 4—4.5 厘米,密被褐色绒毛。花期 6 月;果期 8—9 月。

产海南。越南有分布。模式标本采自越南凉山。

30. 绸缎藤(广西龙州),绸缎木(广西) 图版 64:1—9

*Bauhinia hypochrysa* T. Chen in Guihaia 8:47. 1988.

木质藤本,除成长的叶上面和花瓣内面无毛外,全株密被金黄色或亮棕色丝质长柔毛及茸毛;卷须成对。叶革质,圆形,直径 9—11.5 厘米,基部深心形,先端分裂达叶长的 1/2 或过之,罅口极狭以致两裂片内侧平行且近接连,嫩叶时略覆叠,裂片先端急尖或钝,上面除脉上略被微毛外余无毛,下面密被金黄褐色或亮棕色丝质长柔毛;基出脉 15—17 条,在上面平坦,下面明显凸起;叶柄长 5.5—6.5 厘米,总状花序连总花梗(长 2 厘米)长 9—12 厘米,略呈金字塔形,密被锈色茸毛;苞片和小苞片线形锥尖,长 8—10 毫米;花蕾椭圆形,长 13—15 毫米;花梗粗壮,长 9—10 毫米,顶端具 2 枚小苞片;花托杯状,长 5—6 毫米;萼片披针形,长 12—14 毫米;花瓣黄色,形状大小略不等,具长柄,瓣片倒卵形和椭圆形,长 12—18 毫米,宽 8—13 毫米,外面密被锈色丝质长柔毛,内面无毛,边缘皱曲,瓣柄长 6—10 毫米;能育雄蕊 3 枚,花丝长 25 毫米,仅于基部被毛,花药长约 4 毫米;退化雄蕊 6 枚,长短不一,无毛或基部被毛;子房具短柄,密被锈色丝质长柔毛,花柱纤细,长 15 毫米,无毛,柱头小。荚果长圆形至带状长圆形,扁平,长 10—15 厘米,宽 4—4.5 厘米,果瓣木质,外面密被银白色短茸毛(据采集记录),干时呈灰褐色,开裂后扭曲;种子 2—3 颗,阔椭圆形,扁平,长约 2 厘米,宽约 1.5 厘米。花期 5 月;果熟期 10 月。


本种与红毛羊蹄甲 *B. pyrrhoclada* Drake 近似,区别为该种的花瓣白色;叶分裂仅及叶长的 1/3,罅口又开;基出脉 11—13 条。

产广西西南(龙州)。生于石灰岩山地林中。

31. 红背叶羊蹄甲(新拟) 图版 64:10—11

*Bauhinia rubro-villosa* K. et S. S. Larsen in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 18: 204. 1980. — *B. mirabilis* Gagnep. in Bull. Mus. Hist. Paris ser. 2, 24: 314. 1952, non Merr. (1929).

大藤本;枝粗壮,幼枝具棱;幼嫩部分密被红褐色粗毛。叶厚革质,圆形至扁圆形,长 9—12.5(—30)厘米,宽 10.5—16 厘米,先端分裂达叶长的 1/3—1/2,罅口阔,基部深心形,裂片先端通常圆钝极少为急尖,上面除脉上被皱曲的短柔毛外其余无毛,下面密被红褐色茸毛和短柔毛,脉上尤密,生活时上面深绿色,下面紫红色;基出脉 11—13 条;托叶耳状;长约 10 厘米,早落;叶柄粗壮,长 1.2—6 厘米,密被红褐色粗毛。伞房花序式的总状花序侧生和顶生,被红褐色粗毛;苞片狭三角形,长 5—8 毫米,外面被毛;小苞片与苞片相



1—9. 绸缎藤 *Bauhinia hypochrysa* T. Chen: 1. 花枝, 2. 小枝一段示卷须着生, 3—5. 花瓣, 6. 能育雄蕊, 7. 假雄蕊, 8. 雌蕊, 9. 果。10. 红背叶羊蹄甲 *Bauhinia rubro-villosa* K. et S. S. Larsen: 10. 果枝, 11. 叶片。(余汉平绘)