

纤细,长4—5厘米,与萼外面同密被锈红色茸毛;花托纤细,圆柱形,长5—10毫米;萼片长圆状披针形,先端渐尖,长约12毫米,开花时向下反折;花瓣白色,阔倒卵形,连瓣柄(长3—4毫米)长2—2.5厘米,宽1.2—1.8厘米,顶微缺,边缘皱缩啮蚀状,外面中部至瓣柄均被锈色长柔毛;能育雄蕊3,花丝长15—17毫米,基部被毛;子房无柄,密被锈色长柔毛,花柱细长,除基部外无毛,柱头盾状。荚果倒披针状带形,扁平,长可达30厘米,宽约5厘米,密被锈色短茸毛。花期3—4月;果期6—7月。

产海南、广西(钦县)和云南南部。生于山地疏林中或沟谷旁岩石上。菲律宾也有分布。模式标本采自海南。

34. 缅甸羊蹄甲

Bauhinia ornata Kurz in Journ. As. Soc. Bengal **42** (2): 72. 1873; K. et S. S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc. **25**: 13. 1973, et in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. **18**: 206. 1980. — *B. integrifolia* auct. non Roxb. : Drake in Morot, Journ. de Bot. **5**: 218. 1891.

34a. 缅甸羊蹄甲(原变种)

var. **ornata**

高大藤本,具卷须;幼枝被亮锈色丝质柔毛。叶纸质,心状卵形至心状圆形,长18—21厘米,宽16—18厘米,基部深心形,先端分裂达叶长的1/2或1/3,裂片先端急尖或钝渐尖,罅口中具肋伸出所成之芒尖,嫩时下面疏被伏贴锈色柔毛,不久即变秃净;基出脉9—11条;叶柄长8—11厘米,被锈色丝质柔毛。伞房花序式的总状花序顶生或侧生,多花,被黄褐色柔毛;花梗纤细,长2.5—5厘米,被毛,常聚集于稍长或短的总花梗先端;苞片宿存,披针形,长3—5毫米,被毛;小苞片小,长圆状披针形,着生于花梗中部;萼在花蕾时梨状,贴生柔毛,萼裂片5,卵形,长6—7毫米,开花时仍粘合为佛焰状的2片,后外反且渐离生;花瓣白色,倒卵形,长15—25毫米,宽10—15毫米,外面疏被柔毛,边缘略呈波状;能育雄蕊3枚,花丝长约3厘米;子房近无柄,被黄褐色长柔毛,花柱纤细而长,无毛,柱头小,头状。荚果带状,扁平,开裂,长18—30厘米,宽4—6厘米,果瓣厚,木质,无毛,具斑点,有种子3—4颗;种子近圆形,扁平,褐黑色,直径约27厘米。

产缅甸。我国不产。

34b. 伞序羊蹄甲(变种)(新拟)

var. **subumbellata** (Pierre ex Gagnep.) K. et S. S. Larsen in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. **18**: 209. 1980. — *B. subumbellata* Pierre ex Gagnep. in Not. Syst. Lecomte **2**: 180. 1912. et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 129. 1913. — *B. inflexilobata* Merr. in Journ. Arn. Arb. **21**: 369. 1940.

叶两面完全无毛,嫩时下面亦无毛,自先端2裂达中部,裂片通常急尖,有时钝;叶柄初时被微毛,渐变无毛;小苞片极小,锥尖,互生于花梗中部以上;花梗长35—40毫米;萼