

Wit in Reinwardtia **3**: 490. 1956.

与原亚种的区别为叶较薄,近膜质,分裂仅及叶长的 $1/6-1/5$;花托长 25—30 毫米,为萼裂片长的 4—5 倍;花瓣白色。花期 6—7 月;果期 9—12 月。

产云南和广西。生于山麓和沟谷的密林或灌丛中。缅甸、泰国、老挝有分布。模式标本采自云南南部。

25d. **显脉羊蹄甲**(新拟) 多脉叶羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

subsp. **pernervosa** (L. Chen) T. Chen, comb. nov. —— *B. pernervosa* L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**: 132. 1938, et in Lingnan Sci. Journ. **18**: 272. 1939; 中国主要植物图说——豆科 49. 图 44. 1955. —— *B. cateriviflora* L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**: 129. 1938, pro parte, quoad specim. Tsai 51659, 60496, 61050.

与原亚种的区别为叶革质,较大,长 8—11 厘米,裂片长约等于叶长的 $1/4$;花蕾近无毛;花托长约 2 厘米;花瓣白色,近圆形,瓣柄较短,长 2—3 毫米。花期 6—7 月;果期 9 月。

产云南南部(屏边、文山)。生于海拔 1100—1900 米的沟谷疏林中或密林边缘。

35e. **密花羊蹄甲**(中国主要植物图说——豆科) 图版 68:6—11。

subsp. **caterviflora** (L. Chen) T. Chen, comb. nov. —— *B. caterviflora* L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**: 129. 1938, et in Lingnan Sci. Journ. **18**: 479. 1939, pro parte; 中国主要植物图说——豆科 49. 图 44. 1955。

叶膜质,分裂仅及叶长的 $1/6$,两面被疏柔毛,下面脉上毛较密;花序密被不脱落的锈色柔毛;花白色;花托长 3—3.5 厘米。花期 6—8 月。

产云南西南部(勐遮、勐笼、勐腊)。生于海拔 900—1300 米的山脚灌丛中或沟谷密林中。模式标本采自云南思茅。

36. **首冠藤**(海南) 深裂叶羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

Bauhinia corymbosa Roxb. ex DC. in Mem. Leg. (Mem. 13): 487, fig. 70. 1825, et Prodr. **2**: 515. 1825; Hook. in Curtis's Bot. Mag. **38**: tab. 6621. 1882; L. Chen in Lingnan Sci. Journ. **18**: 273. 1939; 中国主要植物图说——豆科 47. 1955. —— *Phanera corymbosa* Benth. Pl. Jungh. **2**: 264. 1854.

木质藤本;嫩枝、花序和卷须的一面被红棕色小粗毛;枝纤细,无毛;卷须单生或成对。叶纸质,近圆形,长和宽 2—3(—4)厘米,或宽度略超于长度,自先端深裂达叶长的 $3/4$,裂片先端圆,基部近截平或浅心形,两面无毛或下面基部和脉上被红棕色小粗毛;基出脉 7 条;叶柄纤细,长 1—2 厘米。伞房花序式的总状花序顶生于侧枝上,长约 5 厘米,多花,具短的总花梗;苞片和小苞片锥尖,长约 3 毫米;花芳香;花蕾卵形,急尖,与纤细的花梗同被红棕色小粗毛;花托纤细,长 18—25 毫米;萼片长约 6 毫米,外面被毛,开花时反折;花瓣白色,有粉红色脉纹,阔匙形或近圆形,长 8—11 毫米,宽 6—8 毫米,外面中部被丝质长柔

毛,边缘皱曲,具短瓣柄;能育雄蕊3枚,花丝淡红色,长约1厘米;退化雄蕊2—5枚;子房具柄,无毛,柱头阔,截形。荚果带状长圆形,扁平,直或弯曲,长10—16(—25)厘米,宽1.5—2.5厘米,具果颈,果瓣厚革质;种子十余颗,长圆形,长8毫米,褐色。花期4—6月;果期9—12月。

产广东(阳春)、海南。生于山谷疏林中或山坡阳处。世界热带、亚热带地区有栽培供观赏。模式标本(Wallich 5788)采自印度加尔各答的栽培植株(以采自中国广东省的本种种子培植)。

Hosokawa 于1942年(in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **33**: 196)以采自海南陵水的标本发表长序首冠藤 *B. corymbosa* var. *longipes* Hosokawa 一变种,迄今我们从未采到过这种植物,本志暂不收录。

37. **李叶羊蹄甲**(新拟) 牛耳麻、飞机藤(广东信宜),二裂片羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)图版69:1—6。

Bauhinia didyma L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**:131. 1938, et in Lingnan Sc. Journ. **18**: 268. 1939; 中国主要植物图说——豆科45. 1955。

藤本,除花梗基部和腋芽略被红色短柔毛外全株无毛;枝纤细,稍呈之字曲折;卷须单生,纤细。叶膜质,分裂至近基部,裂片斜倒卵形,长12—24毫米,宽9—16毫米,先端圆钝,基部截平,除下面基部脉腋间有红色短髯毛外两面无毛;基出脉每裂片3条,网脉密集,在两面明显凸起;叶柄纤细,长1—2厘米。伞房花序式的总状花序顶生于侧枝上,多花;总花梗长1厘米以下;苞片和小苞片锥尖,长1.5—4毫米;花蕾椭圆形,长约5毫米;花托长10—12毫米,具线纹;萼片阔卵形或披针形,开花时反折;花瓣白色,阔倒卵形,具短柄,连柄长约9毫米,宽约6毫米,外面近基部略被丝质疏柔毛;能育雄蕊3枚,花丝长约1厘米;退化雄蕊3—5枚;子房无毛,具短柄,花柱短,柱头盘状。荚果带状长圆形,扁平而薄,长约10厘米,宽约2.5厘米,两荚缝略加厚,果瓣革质,有不显著的网纹。

产广东西部(阳春、阳江、信宜)和广西(钦县)。生于海拔100米的山腰灌丛中或300—500米的山谷溪边疏林中。模式标本采自广东阳春。

38. **囊托羊蹄甲**(新拟) 越南羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

Bauhinia touranensis Gagnep. in Not. Syst. Lecomte **2**: 181. 1912, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 134, f. 14(8—13). 1913; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 227. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**: 321. 1932; 中国主要植物图说——豆科53,图49. 1955。
——*B. rocheri* Lévl. in Fedde, Repert. Spec. Nov. **11**: 31. 1912. ——*B. genuflexa* Craib in Kew Bull. **1913**: 352. 1913. ——*B. henryi* Craib, l. c.

木质藤本;枝与小枝初时被伏贴短柔毛,后变无毛;卷须纤细,略扁,一面被丝质柔毛。叶纸质,近圆形,长3.5—6(—7)厘米,宽4—6.5(—8)厘米,基部心形,先端分裂达叶长