

毛,边缘皱曲,具短瓣柄;能育雄蕊3枚,花丝淡红色,长约1厘米;退化雄蕊2—5枚;子房具柄,无毛,柱头阔,截形。荚果带状长圆形,扁平,直或弯曲,长10—16(—25)厘米,宽1.5—2.5厘米,具果颈,果瓣厚革质;种子十余颗,长圆形,长8毫米,褐色。花期4—6月;果期9—12月。

产广东(阳春)、海南。生于山谷疏林中或山坡阳处。世界热带、亚热带地区有栽培供观赏。模式标本(Wallich 5788)采自印度加尔各答的栽培植株(以采自中国广东省的本种种子培植)。

Hosokawa 于1942年(in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **33**: 196)以采自海南陵水的标本发表长序首冠藤 *B. corymbosa* var. *longipes* Hosokawa 一变种,迄今我们从未采到过这种植物,本志暂不收录。

37. **李叶羊蹄甲**(新拟) 牛耳麻、飞机藤(广东信宜),二裂片羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)图版69:1—6。

Bauhinia didyma L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**:131. 1938, et in Lingnan Sc. Journ. **18**: 268. 1939; 中国主要植物图说——豆科45. 1955。


藤本,除花梗基部和腋芽略被红色短柔毛外全株无毛;枝纤细,稍呈之字曲折;卷须单生,纤细。叶膜质,分裂至近基部,裂片斜倒卵形,长12—24毫米,宽9—16毫米,先端圆钝,基部截平,除下面基部脉腋间有红色短髯毛外两面无毛;基出脉每裂片3条,网脉密集,在两面明显凸起;叶柄纤细,长1—2厘米。伞房花序式的总状花序顶生于侧枝上,多花;总花梗长1厘米以下;苞片和小苞片锥尖,长1.5—4毫米;花蕾椭圆形,长约5毫米;花托长10—12毫米,具线纹;萼片阔卵形或披针形,开花时反折;花瓣白色,阔倒卵形,具短柄,连柄长约9毫米,宽约6毫米,外面近基部略被丝质疏柔毛;能育雄蕊3枚,花丝长约1厘米;退化雄蕊3—5枚;子房无毛,具短柄,花柱短,柱头盘状。荚果带状长圆形,扁平而薄,长约10厘米,宽约2.5厘米,两荚缝略加厚,果瓣革质,有不显著的网纹。

产广东西部(阳春、阳江、信宜)和广西(钦县)。生于海拔100米的山腰灌丛中或300—500米的山谷溪边疏林中。模式标本采自广东阳春。

38. **囊托羊蹄甲**(新拟) 越南羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

Bauhinia touranensis Gagnep. in Not. Syst. Lecomte **2**: 181. 1912, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 134, f. 14(8—13). 1913; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 227. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**: 321. 1932; 中国主要植物图说——豆科53,图49. 1955。
——*B. rocheri* Lévl. in Fedde, Repert. Spec. Nov. **11**: 31. 1912. ——*B. genuflexa* Craib in Kew Bull. **1913**: 352. 1913. ——*B. henryi* Craib, l. c.

木质藤本;枝与小枝初时被伏贴短柔毛,后变无毛;卷须纤细,略扁,一面被丝质柔毛。叶纸质,近圆形,长3.5—6(—7)厘米,宽4—6.5(—8)厘米,基部心形,先端分裂达叶长



1—6. 李叶羊蹄甲 *Bauhinia didyma* L. Chen : 1.花枝, 2.花, 3.萼片, 4.花瓣, 5.苞片, 6.果。7—13. 云南羊蹄甲 *Bauhinia yunnanensis* Franch. : 7.花枝, 8.花, 9.小苞片, 10.萼片, 11—12.花瓣, 13.果。(余峰绘)