

毛,边缘皱曲,具短瓣柄;能育雄蕊3枚,花丝淡红色,长约1厘米;退化雄蕊2—5枚;子房具柄,无毛,柱头阔,截形。荚果带状长圆形,扁平,直或弯曲,长10—16(—25)厘米,宽1.5—2.5厘米,具果颈,果瓣厚革质;种子十余颗,长圆形,长8毫米,褐色。花期4—6月;果期9—12月。

产广东(阳春)、海南。生于山谷疏林中或山坡阳处。世界热带、亚热带地区有栽培供观赏。模式标本(Wallich 5788)采自印度加尔各答的栽培植株(以采自中国广东省的本种种子培植)。

Hosokawa 于1942年(in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **33**: 196)以采自海南陵水的标本发表长序首冠藤 *B. corymbosa* var. *longipes* Hosokawa 一变种,迄今我们从未采到过这种植物,本志暂不收录。

37. **李叶羊蹄甲**(新拟) 牛耳麻、飞机藤(广东信宜),二裂片羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)图版69:1—6。

Bauhinia didyma L. Chen in Journ. Arn. Arb. **19**:131. 1938, et in Lingnan Sc. Journ. **18**: 268. 1939; 中国主要植物图说——豆科45. 1955。

藤本,除花梗基部和腋芽略被红色短柔毛外全株无毛;枝纤细,稍呈之字曲折;卷须单生,纤细。叶膜质,分裂至近基部,裂片斜倒卵形,长12—24毫米,宽9—16毫米,先端圆钝,基部截平,除下面基部脉腋间有红色短髯毛外两面无毛;基出脉每裂片3条,网脉密集,在两面明显凸起;叶柄纤细,长1—2厘米。伞房花序式的总状花序顶生于侧枝上,多花;总花梗长1厘米以下;苞片和小苞片锥尖,长1.5—4毫米;花蕾椭圆形,长约5毫米;花托长10—12毫米,具线纹;萼片阔卵形或披针形,开花时反折;花瓣白色,阔倒卵形,具短柄,连柄长约9毫米,宽约6毫米,外面近基部略被丝质疏柔毛;能育雄蕊3枚,花丝长约1厘米;退化雄蕊3—5枚;子房无毛,具短柄,花柱短,柱头盘状。荚果带状长圆形,扁平而薄,长约10厘米,宽约2.5厘米,两荚缝略加厚,果瓣革质,有不显著的网纹。

产广东西部(阳春、阳江、信宜)和广西(钦县)。生于海拔100米的山腰灌丛中或300—500米的山谷溪边疏林中。模式标本采自广东阳春。

38. **囊托羊蹄甲**(新拟) 越南羊蹄甲(中国主要植物图说——豆科)

Bauhinia touranensis Gagnep. in Not. Syst. Lecomte **2**: 181. 1912, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 134, f. 14(8—13). 1913; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 227. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**: 321. 1932; 中国主要植物图说——豆科53,图49. 1955。
——*B. rocheri* Lévl. in Fedde, Repert. Spec. Nov. **11**: 31. 1912. ——*B. genuflexa* Craib in Kew Bull. **1913**: 352. 1913. ——*B. henryi* Craib, l. c.

木质藤本;枝与小枝初时被伏贴短柔毛,后变无毛;卷须纤细,略扁,一面被丝质柔毛。叶纸质,近圆形,长3.5—6(—7)厘米,宽4—6.5(—8)厘米,基部心形,先端分裂达叶长

1/6—1/5,裂片先端圆钝,上面无毛,下面初时略被极稀疏柔毛,以后除脉上和脉腋间有锈色柔毛外其余无毛;基出脉7—9条;叶柄长1—2厘米,无毛。伞房式总状花序单生于侧枝顶,或3—4个顶生和侧生于小枝先端,长6—9厘米(包括长1.5—4厘米总花梗);总花梗、花梗和花蕾被伏贴锈色柔毛;苞片和小苞片线形,渐尖,长6—9毫米;花蕾椭圆状至近球形,花梗纤细,最下部的长达2厘米,基部有一卷须;花托与花梗相连接处常屈曲呈90°角,一侧直,他侧基部膨凸呈浅囊状;萼裂片卵形,渐尖,与花托等长;花瓣白带淡绿色,不相等,具长柄,瓣片近圆形、卵形和倒卵形,长约6毫米,背面中部被丝毛;能育雄蕊3,花丝无毛;子房长4—5毫米,缝线和子房柄均被锈色柔毛,柱头略阔,头状。荚果带状,扁平,长12—16厘米,宽3—3.5厘米,荚缝略增厚,果瓣革质。花期3—6月;果期8—10月。

产云南南部、贵州和广西西南部。生于海拔500—1000米的山地沟谷疏林或密林下及石山灌丛中。越南有分布。模式标本采自越南岷港。

39. 黔南羊蹄甲 图版 70:6—9

Bauhinia quinanensis T. Chen in Cuihaia 8:48. 1988.

木质藤本;嫩枝、花序、叶柄和叶下面被锈色短柔毛;卷须与叶对生,被毛。叶纸质,阔卵形至近圆形,长5—8厘米,宽4—6.5厘米,先端圆或稍凹缺,基部近截形或浅心形,上面无毛,下面密被锈色柔毛;基出脉9条;叶柄长1—2厘米,被毛。伞房花序式的总状花序1或2个顶生,有花8—20朵,长3.5—6厘米,宽长近相等,密被锈色短茸毛;总花梗短,长5—12毫米;苞片线形,渐尖,长5—7毫米;小苞片丝状,着生于花梗中部,长4—6毫米;花梗长15—22毫米,被锈色短茸毛;花托长8—9毫米,基部一侧略膨凸,但不呈囊状,被短柔毛;萼片5,披针形,长5—6毫米,宽约2毫米,内面无毛,外面被锈色柔毛,花后下反;花瓣白色,具柄,3片近菱形,2片椭圆形,长6—8毫米,宽4—7毫米,外面中部被毛,瓣柄长为瓣片的1/2;能育雄蕊3枚,花丝无毛,长9—11毫米;退化雄蕊7枚,其中2枚离生的较长,余5枚基部合生;子房具柄,无毛,花柱短,柱头头状。荚果带状,极扁平,长约28厘米,宽4—4.5厘米,果瓣薄革质,无毛,干时黑色,有光泽,具横脉纹及网纹,荚缝略凸起;种子椭圆形,扁平,长约8毫米,宽约6毫米,种皮褐色。花期5月;果期8月。

本种与产越南的 *Bauhinia clemensiorum* Merr. 近似,区别为该种的花玫瑰红色;花梗较短(长12—15毫米),花托较长(长约2厘米),花瓣无柄或具短柄,(柄长等于瓣片长的1/5)。

产贵州西南部(安龙、册亨、兴仁)。生于海拔1000—1300米的山坡灌丛中。模式标本采自贵州安龙。

40. 大苗山羊蹄甲 飞蛾藤(广西大苗山) 图版 70:1—5

Bauhinia damiaoshanensis T. Chen in Cuihaia 8:49. 1988.

木质藤本;花序和卷须的一面被红棕色小粗毛;枝纤细,无毛;卷须单生。叶纸质,扁