

Bauhinia dioscoreifolia L. Chen in Journ. Arn. Arb. 20: 438. 1939.

藤本;枝圆柱形,无毛,密布小皮孔。叶厚纸质,卵形,长9—14厘米,宽7—10.5厘米,基部通常截形,有时浅心形,先端2裂达叶长的1/3—1/2(嫩叶常分裂至基部),裂片急尖或渐尖;基出脉7,网脉在两面明显凸起;叶柄纤细,长4.5—7厘米,近无毛,花未见。果序顶生;总轴被红褐色、伏贴的柔毛;荚果长圆形,长14—16厘米,宽3.5—4厘米,具短的果颈,两端急尖;果瓣木质,果开裂后扭曲,外面略有皱纹。果期9月。

海南特产。分布于岛的西南部和南部。生于海拔300—500米的山地密林中。模式标本采自海南东方县。

IV. 甘豆族 Detarieae DC.

DC. Prodr. 2: 521. 1825.

一回羽状复叶,有时仅具1对小叶或单小叶。花两性,辐射对称至明显的两侧对称;花托浅杯状或管状;萼片通常4—5片,在花蕾时常包覆着花瓣;花瓣0—5片;能育雄蕊2—10枚或多数;花药基着或背着,药室纵裂,有时具退化雄蕊;子房具柄或无柄,柄与花托壁离生或贴生。

全世界共54属。产热带地区。我国连引种栽培的有5属。

16. 仪花属¹⁾ *Lysidice* Hance

Hance in Journ. Bot. 5: 298. 1867; Taub. in Engl. u Prantl, Nat.

. Pflanzenfam. 3(3): 144. 1894.

灌木或乔木。叶为偶数羽状复叶,有小叶3—5对;小叶对生,具短柄,基部微偏斜,两侧稍不对称;托叶小,钻状或尖三角状,早落或迟落。圆锥花序生枝顶;花美丽,紫红色或粉红色,具梗,基部托以红色或白色的苞片和小苞片,小苞片小,成对着生于花梗顶部或近顶部;花萼管状,顶部4裂,裂片覆瓦状排列,花后反折;后面3片花瓣大,倒卵形,具长柄,前面2片小,退化呈鳞片状或钻状;发育雄蕊2枚,分离或基部稍连合,花丝伸长,芽时反折,花药椭圆形,纵裂;退化雄蕊3—8枚,不等长,钻状,无花药或有1—3枚圆形小花药;子房扁长圆形,具柄,其柄与萼管贴生,有胚珠6—14颗;花柱细长,柱头小,头状。荚果两侧压扁,长圆形或倒卵状长圆形,厚革质或木质,具果颈,开裂,果瓣平或稍扭转或成螺旋状卷曲;种子扁平,长圆形、斜阔椭圆形至近圆形,有光泽,边缘不增厚或明显增厚成一圈狭边,子叶扁平,胚小,基生。

1) 属名异名: 麻杞木属(广州植物志), 广檀木属(海南植物志), 龙眼参属、铁罗伞属(土名)。

属模式种：仪花 *L. rhodostegia* Hance

2 种。产我国南部至西南部。越南也有分布。

仪花属分种检索表

1. 苞片、小苞片粉红色；萼管长 1.2—1.5 厘米，比萼裂片长；种子边缘不增厚成狭边，种皮薄，里面无胶质层；灌木或小乔木…………… 1. 仪花 *L. rhodostegia* Hance
1. 苞片、小苞片白色；萼管长 5—9 毫米，比萼裂片短；种子边缘明显增厚成一圈狭边，种皮较厚，里面紧粘着一层胶质层；乔木。…………… 2. 短萼仪花 *L. brevicalyx* Wei

1. 仪花(中国植物科属检索表) 单刀根(广西)图版 71: 1—5

Lysidice rhodostegia Hance in Journ. Bot. 5: 298. 1867; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2:199. 1913; K. et S. S. Larsen in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 18:130. 1980.

灌木或小乔木，高 2—5 米，很少超过 10 米。小叶 3—5 对，纸质，长椭圆形或卵状披针形，长 5—16 厘米，宽 2—6.5 厘米，先端尾状渐尖，基部圆钝；侧脉纤细，近平行，两面明显；小叶柄粗短，长 2—3 毫米。圆锥花序长 20—40 厘米，总轴、苞片、小苞片均被短疏柔毛；苞片、小苞片粉红色，卵状长圆形或椭圆形，苞片长 1.2—2.8 厘米，宽 0.5—1.4 厘米，小苞片小，长 2—5 毫米，极少超过 5 毫米；萼管长 1.2—1.5 厘米，比萼裂片长 1/3 或过之，萼裂片长圆形，暗紫红色；花瓣紫红色，阔倒卵形，连柄长约 1.2 厘米，先端圆而微凹；能育雄蕊 2 枚，花药长约 4 毫米；退化雄蕊通常 4 枚，钻状；子房被毛，有胚珠 6—9 颗，花柱细长，被毛。荚果倒卵状长圆形，长 12—20 厘米，基部 2 缝线不等长，腹缝较长而弯拱，开裂，果瓣常成螺旋状卷曲；种子 2—7 颗，长圆形，长 2.2—2.5 厘米，宽 1.2—1.5 厘米，褐红色，边缘不增厚，种皮较薄而脆，表面微皱折，里面无胶质层。花期 6—8 月；果期 9—11 月。

产广东高要、茂名、五华等地以及广西龙州和云南。生于海拔 500 米以下的山地丛林中，常见于灌丛、路旁与山谷溪边。广州近郊庭园中有少量栽培。越南也有分布。模式标本采自广东高要。

本种根、茎、叶有小毒，能散瘀消肿，止血止痛。可治跌打损伤，骨折，风湿关节炎，外伤出血等症。韧皮纤维可代麻。花美丽，是一优良的庭园绿化树种。

2. 短萼仪花(广西植物) 麻杞木(广东)，麻轧木(广西) 图版 71:6—7

Lysidice brevicalyx Wei in Guihaia 3: 12. 1983. — *L. rhodostegia* auct. non Hance (1867): Hance in Journ. Bot. 11:207. 1873, *ibid.* 21: 298. 1883.

乔木，高 10—20 米，胸径 20—30 厘米，小叶 3—4(—5) 对，近革质，长圆形、倒卵状长圆形或卵状披针形，长 6—12 厘米，宽 2—5.5 厘米，先端钝或尾状渐尖，基部楔形或钝。圆锥花序长 13—20 厘米，披散，苞片和小苞片白色，阔卵形、卵状长圆形或长圆形，苞片长