

属模式种：仪花 *L. rhodostegia* Hance

2 种。产我国南部至西南部。越南也有分布。

仪花属分种检索表

1. 苞片、小苞片粉红色；萼管长 1.2—1.5 厘米，比萼裂片长；种子边缘不增厚成狭边，种皮薄，里面无胶质层；灌木或小乔木…………… 1. 仪花 *L. rhodostegia* Hance
1. 苞片、小苞片白色；萼管长 5—9 毫米，比萼裂片短；种子边缘明显增厚成一圈狭边，种皮较厚，里面紧粘着一层胶质层；乔木。…………… 2. 短萼仪花 *L. brevicalyx* Wei

1. 仪花(中国植物科属检索表) 单刀根(广西)图版 71: 1—5

Lysidice rhodostegia Hance in Journ. Bot. 5: 298. 1867; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2:199. 1913; K. et S. S. Larsen in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 18:130. 1980.

灌木或小乔木，高 2—5 米，很少超过 10 米。小叶 3—5 对，纸质，长椭圆形或卵状披针形，长 5—16 厘米，宽 2—6.5 厘米，先端尾状渐尖，基部圆钝；侧脉纤细，近平行，两面明显；小叶柄粗短，长 2—3 毫米。圆锥花序长 20—40 厘米，总轴、苞片、小苞片均被短疏柔毛；苞片、小苞片粉红色，卵状长圆形或椭圆形，苞片长 1.2—2.8 厘米，宽 0.5—1.4 厘米，小苞片小，长 2—5 毫米，极少超过 5 毫米；萼管长 1.2—1.5 厘米，比萼裂片长 1/3 或过之，萼裂片长圆形，暗紫红色；花瓣紫红色，阔倒卵形，连柄长约 1.2 厘米，先端圆而微凹；能育雄蕊 2 枚，花药长约 4 毫米；退化雄蕊通常 4 枚，钻状；子房被毛，有胚珠 6—9 颗，花柱细长，被毛。荚果倒卵状长圆形，长 12—20 厘米，基部 2 缝线不等长，腹缝较长而弯拱，开裂，果瓣常成螺旋状卷曲；种子 2—7 颗，长圆形，长 2.2—2.5 厘米，宽 1.2—1.5 厘米，褐红色，边缘不增厚，种皮较薄而脆，表面微皱折，里面无胶质层。花期 6—8 月；果期 9—11 月。


产广东高要、茂名、五华等地以及广西龙州和云南。生于海拔 500 米以下的山地丛林中，常见于灌丛、路旁与山谷溪边。广州近郊庭园中有少量栽培。越南也有分布。模式标本采自广东高要。

本种根、茎、叶有小毒，能散瘀消肿，止血止痛。可治跌打损伤，骨折，风湿关节炎，外伤出血等症。韧皮纤维可代麻。花美丽，是一优良的庭园绿化树种。

2. 短萼仪花(广西植物) 麻杞木(广东)，麻轧木(广西) 图版 71:6—7

Lysidice brevicalyx Wei in Guihaia 3: 12. 1983. — *L. rhodostegia* auct. non Hance (1867): Hance in Journ. Bot. 11:207. 1873, *ibid.* 21: 298. 1883.

乔木，高 10—20 米，胸径 20—30 厘米，小叶 3—4(—5) 对，近革质，长圆形、倒卵状长圆形或卵状披针形，长 6—12 厘米，宽 2—5.5 厘米，先端钝或尾状渐尖，基部楔形或钝。圆锥花序长 13—20 厘米，披散，苞片和小苞片白色，阔卵形、卵状长圆形或长圆形，苞片长



1—5. 仪花 *Lysidice rhodostegia* Hance: 1. 花枝, 2. 叶, 3. 花, 4. 果, 5. 种子。 6—7. 短萼
仪花 *Lysidice brevicalyx* Wei: 6. 花, 7. 种子。(邓盈丰绘)

1.5—3.1 厘米,小苞片长 0.5—1.5 厘米;萼管较短,长 5—9 毫米,裂片长圆形至阔长圆形,比萼管长;花瓣倒卵形,连柄长 1.6—1.9 厘米,先端近截平而微凹,紫色;能育雄蕊的花药长 3—4 毫米,药室边缘紫红色;退化雄蕊 8 枚或 5—6 枚,不等长;子房沿二缝线被长柔毛,有胚珠 9—14 颗。荚果长圆形或倒卵状长圆形,长 15—26 厘米,宽 3.5—5 厘米,基部圆,二缝线等长或近等长,开裂,果瓣平或稍扭转;种子 7—10 颗,长圆形、斜阔长圆形至近圆形,长 2—2.8 厘米,宽 1.5—2.2 厘米,栗褐色或微带灰绿,光亮,边缘增厚成一圈狭边,种皮脆壳质,里面紧粘着一层白色海绵状胶质层,干后呈锈红色,胚小,基生。花期 4—5 月;果期 8—9 月。

产广东茂名、封开、云浮、高要、广州、香港,广西隆林、田林、百色、都安、龙州、容县,贵州贞丰、望谟、安龙以及云南等。生于海拔 500—1000 米的疏林或密林中,常见于山谷、溪边。模式标本采自广州华南植物园(由广西百色引入栽培)。

本种木材黄白色,坚硬,是优良建筑用材。根、茎、叶亦可入药,性能如仪花。

17. 无忧花属 *Saraca* Linn.

Linn. Mant. Pl. 1 : 98. 1767; Burm. f. Fl. Ind. 85. t. 25. 1768;

Zuijderh. in Blumea 15: 414. 1967.

乔木。叶为偶数羽状复叶,有小叶数对;小叶革质,其柄粗壮,常具腺状结节;托叶 2 枚,通常连合成圆锥形鞘状,早落。伞房状圆锥花序腋生或顶生;总苞片早落;苞片 1 枚,小或大于小苞片,被毛或无毛,脱落或宿存;小苞片 2 枚,近对生,通常宿存且具颜色;花具短梗,黄色至深红色,两性或单性,花瓣缺;花萼管状,萼管伸长,上部略膨大,顶部具一花盘,裂片 4,罕有 5 或 6,花瓣状,卵形或长圆形,稍不等大,覆瓦状排列;雄蕊 4—10 枚,完全发育或不完全发育而其中 1—2 枚退化,着生于萼管喉部的花盘上,花丝伸长,分离,芽时常反折,花药长圆形或近圆形,背着,药室纵裂;子房扁长圆形,被毛或无毛,具短柄,其柄与萼管贴生,有胚珠数十至十余颗,花柱线形,柱头头状,顶生。荚果扁长圆形,稍弯斜,革质至近木质,2 瓣裂;种子 1—8 颗,椭圆形或卵形,两侧压扁,种皮脆壳质,胚根小,直立。

属模式种: *S. indica* Linn.

约 20 种。分布于亚洲热带地区。我国有 2 种,产云南西部和西南部至广西西南部。

根据《台湾植物志》第六卷总目录记载,台湾还引种有 *S. indica* Linn. 和 *S. cauliflora* Baker。由于数量少,不普遍,本志暂不载。

无忧花属分种检索表

1. 雄蕊 4 枚,全发育;苞片和小苞片小,且大小相若,长不超过 5 毫米,宿存;花梗具关节.....