

1842; Lavallee, Arb. Segrez. Enum. 54. 1877; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 32. 1921, et l. c. 7: 156. 1926; 中国主要植物图说·豆科 135. 1955. — *S. pubescens* Tausch. in Flora 17: 489. 1834. — *Styphnolobium japonicum* Schott var. *pubescens* Hort. apud Kirsch. in Petzold & Kirsch. Arb. Musc. 366. 1864. — *S. japonica* Linn. var. *tomentosa* Hort. apud Dieck, Haupt-Kat. Zoschen. Nachtr. 1: 26. 1887. — *S. japonica* Linn. var. *violacea* Dipp. Handb. Laubh. 2: 663. 1893. p. non Carr.) 1865. — *S. tomentosa* Hort. ex Dipp. l. c. non Linn. 1753. — *S. sinensis* Hort. apud Rehd. in Moller's Deutsch. Gart.-Zeit. 13: 184. 1898, non Forrest, nec Rosier — *S. chinensis* Hort. ex Zebel in Beissn. Schelle et Zabel, Handb. Laubh.-Ben. 256. 1903.

本变种与原变种的区别为：本变种小叶下面和小叶柄疏被柔毛，中脉基部和小叶柄上毛甚密且较长。

分布与原变种基本相同。模式标本采自四川成都附近。

本变种在原始记载中提到：叶轴和小叶柄及叶两面均密被单毛，根据现有大量标本观察，这种情况只在嫩植株上见到，老株叶轴和小叶上面的毛均脱落，只有小叶下面，特别是中脉的基部及小叶柄上还存留有较多的长柔毛。

20c. **堇花槐** (变种) (中国主要植物图说·豆科) 紫花槐 (河北习见树木图说)

var. **violacea** Carr. in Rev. Hort. 465. 1865; Rehd. in Bailey, Cycl. Hort. 3: 3191. 1939; 中国主要植物图说·豆科 135. 1955.

本变种小叶上面多少被柔毛，翼瓣和龙骨瓣紫色，旗瓣白色或先端带有紫红脉纹与原变种不同。

各地栽培供观赏。

20d. **宜昌槐** (变种) (植物分类学报)

var. **vestita** Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 32. 1921.

本变种小叶上面疏被贴生柔毛，下面密被长柔毛，小枝、小叶柄、叶轴和花序上的茸毛状绒毛到第二年仍宿存，与原变种不同。

产湖北 (宜昌)。模式标本采自湖北宜昌。

本种尚有下列两个类型我国可能有分布，但未见标本，权录此，留待以后考订。

var. **praecox** Schwer. in Mitteil. Deutsch. Dendr. Ges. 256. 1907.

主要特征是：花生在二年生老枝上。

f. **columnalis** Schwer. l. c.; Rehd. in Bailey, Cycl. Hort. 3: 3191. 1939.

主要特征是：体态狭圆柱状。

21. **短蕊槐** (植物分类学报) 图版 27: 7—11

Sophora brachygyna C. Y. Ma in Act. Phytotax. Sin. 20: 472. 1982.

乔木，高 20 米以上；树皮灰褐色。当年生枝绿色，具灰白色皮孔。羽状复叶长达 20