

云南。生于山地林中或灌丛中，山沟溪旁及有小树林的坡地常见，海拔 600—1400 米。模式标本采自湖北宜昌。

本种在我国分布颇广。木材黄色或白色，材质坚密，能耐强力冲撞，常用作车轴、榨油机轴心、枪托、各种工具柄等；根药用，可治疗疮。

25. **南岭黄檀** (中国主要植物图说·豆科) 南岭檀 (海南植物志)，水相思 (广州)，黄类树 (海南)，茶丫藤 图版 31: 10—18

Dalbergia balansae Prain in Journ. As. Soc. Beng. 70(2): 54. 1901, et in Ann. Bot. Gard. Calc. 10: 90. f. 72. 1904; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 2: 487. 1916; 中国主要植物图说·豆科 577. 图 562. 1955; 海南植物志 2: 290. 1965. — *D. lanceolaria* auct. non Linn. f.: Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 193. 1887.

乔木，高 6—15 米；树皮灰黑色，粗糙，有纵裂纹。羽状复叶长 10—15 厘米；叶轴和叶柄被短柔毛；托叶披针形；小叶 6—7 对，皮纸质，长圆形或倒卵状长圆形，长 2—3 (—4) 厘米，宽约 2 厘米，先端圆形，有时近截形，常微缺，基部阔楔形或圆形，初时略被黄褐色短柔毛，后变无毛。圆锥花序腋生，疏散，长 5—10 厘米，径约 5 厘米，中部以上具短分枝；总花梗、分枝和花序轴疏被黄褐色短柔毛或近无毛；基生小苞片卵状披针形，副萼状小苞片披针形，均早落；花长约 10 毫米；花梗长 1—2 毫米，与花萼同被黄褐色短柔毛；花萼钟状，长约 3 毫米，萼齿 5，最下 1 枚较长，先端尖，其余的三角形，先端钝，上方 2 枚近合生；花冠白色，长 6—7 毫米，各瓣均柄，旗瓣圆形，近基部有 2 枚小附属体，先端凹缺，翼瓣倒卵形，龙骨瓣近半月形；雄蕊 10，合生为 5+5 的二体；子房具柄，密被短柔毛，有胚珠 (1—) 3 (—5) 粒，花柱短，柱头小，头状。荚果舌状或长圆形，长 5—6 厘米，宽 2—2.5 厘米，两端渐狭，通常有种子 1 粒，稀 2—3 粒，果瓣对种子部分有明显网纹。花期 6 月。


产浙江、福建、广东、海南、广西、四川、贵州。生于山地杂木林中或灌丛中，海拔 300—900 米。越南北部也有分布。

我国南部城市常植为蔽荫树或风景树，又为紫胶虫寄主植物。

26. **多体蕊黄檀** (中国主要植物图说·豆科)

Dalbergia polyadelpa Prain in Ann. Bot. Gard. Calc. 10: 84. 1904; 中国主要植物图说·豆科 570. 图 558. 1955.

乔木，高 4—10 米。羽状复叶长 10—20 厘米；叶轴、叶柄密被锈色茸毛；托叶卵状披针形，极早落；小叶通常 4 对，有时 3 或 5—6 对，皮纸质，卵形至卵状披针形，长 1.5—4 (—7) 厘米，宽 8—16 (—28) 毫米，先端渐尖或钝，有时具凸尖，基部楔形或有时圆形，上面暗绿色，疏被短柔毛，后除中脉外，无毛，下面青白色，疏被伏贴短柔毛；小叶柄长约 3 毫米，密被锈色茸毛。圆锥花序腋生或腋生，长约 6 厘米，径约 5.5 厘米，分枝短，呈聚伞花序状；总花梗稍粗壮，无毛；花梗长约 5 毫米，与花序分枝同被锈色短



图版 31 1—9. 大金刚藤 *Dalbergia dyeriana* Prain: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花萼 (展开); 4. 旗瓣; 5. 翼瓣; 6. 龙骨瓣; 7. 雄蕊; 8. 雌蕊; 9. 荚果。 10—18. 南岭黄檀 *Dalbergia balansae* Prain: 10. 花枝; 11. 花; 12. 花萼 (展开); 13. 旗瓣; 14. 翼瓣; 15. 龙骨瓣; 16. 雄蕊; 17. 雌蕊; 18. 荚果。(黄少容绘)