

21 属，集中分布南美洲。我国有 3 属，8 种，3 变种。

分属检索表

1. 花数朵簇生枝端；小叶线形，贝合状；生于高原 30. 冬麻豆属 *Salweenia* Baker f.
1. 总状花序；小叶长圆形至阔卵形；生于低地。
 2. 小叶通常 10 对以下，托叶常变成刺；荚果扁平，腹缝线上具窄翅，种子间不具横隔；乔木或灌木 21. 刺槐属 *Robinia* Linn.
 2. 小叶通常 20 对以上，托叶不变成刺；荚果细长，缝线增厚无翅，种子间具横隔；草本 22. 田菁属 *Sesbania* Scop

20. 冬麻豆属 *Salweenia* Baker f.

Baker f. in Journ. Bot. 73: 134. 1935; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1:
368. 1964.

常绿灌木。奇数羽状复叶；托叶革质，无小托叶；小叶对生，线形，全缘，贝合状，花簇生枝顶；苞片与小苞片细小，小苞片位于花萼下面；花梗短；花萼钟状，萼齿 5，正三角形，上方 2 齿部分合生；旗瓣倒卵形，先端微凹，翼瓣长圆形，具长柄，龙骨瓣舟状，具长柄；雄蕊二体，花药同型，背着，花盘贴生花萼内面基部；子房具长柄。荚果线状长圆形，扁平，具果颈，2 瓣开裂，果瓣薄，近纸质；种子近心形，压扁。

本属模式种：*Salweenia wardii* Baker f.

仅 1 种，特产我国西南部高原。

1. 冬麻豆（中国种子植物科属辞典） 冬麻（西藏） 图版 70

Salweenia wardii Baker f. in Journ. Bot. 73: 135. 1935; 中国主要植物图说·豆科 141. 1955, fig. err.: 中国高等植物图鉴 2: 359. 1972; 西藏植物志 2: 715. 1985.

常绿灌木，高 0.5—2 米。茎直立，绿黄色，1—2 年生茎枝干时具纵棱及沟槽，密被灰白色长柔毛；芽鳞三角形，先端锐尖至渐尖，宿存。羽状复叶长 1.2—3 厘米；叶柄与叶轴均被灰白色长柔毛，叶轴上面具沟槽；托叶三角形，长 1—2 毫米，被灰白色长柔毛，宿存；小叶 3—7（—9）对，贝合状，线形至线状倒披针形，长 1—2.7 厘米，宽 2—3.5 毫米，先端急尖或钝形，全缘，内卷，幼时两面密被灰白色平伏短柔毛，后上面渐脱落至无毛，侧脉不明显；无小叶柄。花 3—7 朵簇生于小枝顶端；苞片卵状三角形，长 3—5 毫米，锐尖，上面无毛，下面被灰白色长柔毛，宿存；花梗长 5—7 毫米，被灰白色柔毛；小苞片 2 枚，针状，长 2—3 毫米；花萼钟状，长 8—9 毫米，萼齿 5，三角形，长 1—2 毫米，齿端被灰白色细柔毛；花冠黄色，旗瓣倒卵形至阔倒卵形，长 16—18 毫米，宽 13—15 毫米，先端微凹，翼瓣长圆形，长约 12 毫米，宽约 5 毫米，瓣柄长约 8 毫米，龙骨瓣舟状，长约 11 毫米，基部具柄，长约 8 毫米；雄蕊二体；花丝长 14—18 毫米；子