

植物图说·豆科 231. 1955.

灌木，高约 2.5 米。幼枝具棱，被黄褐色卷曲柔毛，老枝红褐色或灰色，圆柱形，常曲折，近无毛，皮孔明显。羽状复叶长达 13 厘米，叶柄长达 2 厘米，叶轴圆柱形，上面微扁平，与叶柄均密生白色长柔毛；托叶线状披针形，长 5—8 毫米，早落；小叶 2—4 对，对生或近对生，长圆状椭圆形、椭圆形或卵形，长 2—5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，顶生小叶常倒卵形、阔椭圆形，稀阔卵形，长 4.5—5 厘米，宽 3—5 厘米，先端圆钝或急尖，基部阔楔形至圆形，上面绿色，有白色短丁字毛，下面淡绿色，密生白色卷曲绒毛，边缘间生有棕褐色毛，中脉上面微凹，下面隆起，侧脉 8—10 对，下面明显；小叶柄长约 2 毫米；小托叶不明显。总状花序长达 15 厘米；总花梗长 2—3 厘米，花序轴具棱，与总花梗均生白色卷曲丁字毛；苞片早落；花梗长 2—3 毫米，被毛；花萼钟状，长 4.5—5 毫米，密生黄褐色柔毛，萼筒长约 2.5 毫米，萼齿三角形，先端钻形，不等长，最下萼齿与萼筒等长；花冠淡黄色，旗瓣倒卵状长圆形，长 12—15 毫米，宽 6—7 毫米，先端微凹，基部无瓣柄，外面有白色柔毛，翼瓣长 10—12 毫米，宽约 2.5 毫米，仅边缘具毛，龙骨瓣与旗瓣近相等，先端被棕褐色毛，基部具瓣柄，距长 0.5 毫米；花药卵状椭圆形，顶端具小突尖头，药隔两端无毛；子房有胚珠 12—15 粒。荚果稍扁平，长约 7 厘米，顶端弯钩状，有黄褐色或灰色半开展丁字毛。花期 6 月，果期 8—9 月。

产四川（木里）、云南（丽江）。生于干燥灌木丛中，海拔 2 100—2 700 米。模式标本采自云南丽江东山及奉可。

亚组 2. 庭藤亚组 Subsect. *Decorae* Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 164. 1989.

本亚组模式种: *Indigofera decora* Lindl.

我国有 9 种。

14. 庭藤（中国主要植物图说·豆科）

Indigofera decora Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. 1: 68. 1846, et Bot. Reg. 32. t. 22. 1846; Hook. in Curtis's Bot. Mag. t. 5063. 1858; Benth. Fl. Hongk. 77. 1861; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 156. 1886; Palibin in Act. Hort. Petrop. 17: 63. 1898; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 9: 75. 1912; Craib. in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 68. 1913; 中国主要植物图说·豆科 244. 图 234. 1955; Ohwi Fl. Jap. 809. 1956; Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 171. 1989.

14a. 庭藤(原变种) 图版 78: 1—4

var. ***decora***

灌木，高 0.4—2 米。茎圆柱形或有棱，无毛或近无毛。羽状复叶长 8—25 厘米；叶柄长 1—1.5 厘米，稀达 3 厘米，叶轴扁平或圆柱形，上面有槽或无槽，无毛或疏被丁字