

Indigofera neoglabra Hu ex Wang et Tang 中国主要植物图说·豆科 234. 1955; Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 171. 1989. — *I. glabra* Chien in Contrib. Boil. Lab. Sci. Soc. China 8: 130. 1932, non Linn. 1753.

灌木，高约 60 厘米，除花和花序轴外全体无毛或近无毛。茎褐色，圆柱形，曲折，节明显，幼枝有棱，羽状复叶长约 20 厘米；叶柄长 2.5—3.5 (—4.3) 厘米，叶轴圆柱形，上面具浅槽；托叶线状钻形，长 10—12 毫米，宿存；小叶 2—3 对，对生或近对生，卵形、菱状卵形或椭圆形，长 3.5—8 厘米，宽 1.5—3.5 (—4) 厘米，先端急尖或短渐尖，具小尖头，基部阔楔形或近圆形，上面绿色，下面淡绿色，两面无毛或近无毛，中脉上面微凹，下面隆起，侧脉 9—10 对，下面细脉显著；小叶柄长约 3 毫米；小托叶长约 5 毫米。总状花序长达 24 厘米；总花梗长约 4.5 厘米，花序轴具棱线，疏被短毛；苞片线形，长 4—5 毫米，早落；花梗长 2 (—4) 毫米，有灰白色短毛，花萼斜杯状，长约 3.5 毫米，外面有棕色并间生白色丁字毛，萼筒长约 1.5 毫米，萼齿三角状钻形，边缘疏生腺状睫毛，最下萼齿长约 2 毫米；花冠淡紫色，花瓣近等长，旗瓣倒卵状长圆形，长 12—14 (—15) 毫米，宽 4.5—5 毫米，外面密生短柔毛，先端圆形，翼瓣狭线形，龙骨瓣镰状长圆形，先端均急尖，边缘及外面上部被短柔毛；花药卵形或长卵形，顶端具凸尖头，基部有髯毛；子房无毛，有胚珠 11—13 粒。花期 5 月。

产浙江 (仙居、青田)。生于山坡路旁，海拔 500 米。模式标本采自仙居。


21. 长总梗木蓝 (植物分类学报) 图版 78: 5—7

Indigofera longipedunculata Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 21: 331. 1983, et 27: 170. 1989.

亚灌木，高达 1 米。茎圆柱形，曲折，分枝明显四棱，与叶柄、叶轴及花序轴多少被多节卷毛。羽状复叶长达 20 厘米；叶柄长 2—7 厘米；托叶早落；小叶 2—3 对，阔卵形、卵形或椭圆形，长 4—7 厘米，宽 2—3.7 厘米，先端短尖或圆钝，具小尖头，基部阔楔形至圆形，上面疏被白色短丁字毛，下面特别是沿脉及细脉被多节卷毛，侧脉 5—6 对，向边缘弧状弯曲，细脉明显隆起；小托叶线形，长 3—5 (—8) 毫米。总状花序腋生，比复叶稍长，长达 25 厘米；总花梗具条纹，基部成四棱形，长达 7 厘米；苞片线形，长 3—5 毫米，花梗细，长 2.5—4 毫米；萼筒长 2—2.5 毫米，下萼齿三角状钻形，与萼筒等长，侧萼齿阔披针形，上萼齿常呈三角形，长约 1 毫米；花冠紫红色或白色，旗瓣倒卵状长圆形，长 14—15 毫米，宽 8—9 毫米，外面密被短柔毛，翼瓣倒披针状线形，宽约 3.5 毫米，基部具耳，龙骨瓣镰形，宽约 4 毫米，中部以下有距；花药阔长圆形，两端有髯毛；子房无毛。花期 5 月。

产浙江、江西。生于山坡路旁及林中。海拔 700—1 000 米。模式标本采自浙江鄞县四明山。

22. 浙江木蓝 (中国高等植物图鉴) 巴克木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版 78: 8—9



图版 78 1—4. 庭藤 *Indigofera decora* Lindl.: 1. 花枝; 2. 花萼 (展开背面观); 3. 花药; 4. 雌蕊。 5—7. 长总梗木蓝 *Indigofera longipedunculata* Y. Y. Fang et C. Z. Zheng.: 5. 花枝 (放大一小段, 示多节毛); 6. 花萼; 7. 花药。 8—9. 浙江木蓝 *Indigofera parkesii* Craib: 8. 花枝; 9. 花。(何冬泉绘)