

长或稍超出，花密集；总花梗长 1—1.5 厘米；苞片线形，与小叶柄等长；花梗长约 2 毫米；萼筒长约 1 毫米，萼齿三角形，长约 0.5 毫米，被褐色丁字毛，有时边缘有腺体；花冠淡紫色，旗瓣长圆形，长约 6 毫米，宽约 4 毫米，翼瓣倒披针形，长约 5 毫米，宽约 1.3 毫米，龙骨瓣比翼瓣略长，中部有长约 1 毫米的距；花药卵形；子房无毛。果序比复叶长，长达 26 厘米；荚果直立，线状圆柱形，有时近镰形，长 2—3.5 厘米，有 6—10 粒种子，种子间常缢缩，外面被褐色毛，成熟时变黑色；种子圆形，种皮锈褐色，有光泽。花期 6 月，果期 6—8 月。

产湖南、广东、广西、贵州等省区。生于河岸边及湿润小山坡，海拔 700 米。模式标本采自湖南黔阳。

27. 尖叶木蓝 (海南植物志) 图版 82: 1—3

Indigofera zollingeriana Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 310. 1855; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 5: 66. 1910, et Enum. Philip. Fl. Pl. 2: 276. 1923; Craib Fl. Siam. Enum. 1: 383. 1928; 海南植物志 2: 257. 1965; 台湾植物志 3: 312. 1977; de Kort et Thijssse in Blumea 30: 142. 1984. — *I. teysmanii* Miq. l. c. 1083.; Prain et Baker in Journ. Bot. 40: 143. 1902; Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 71. 1913; 中国主要植物图说·豆科 258. 图 253. 1955. — *I. benthamiana* Hance in Ann. Sci. Nat. Bot. 4(18): 219. 1862; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 156. 1886.

直立亚灌木，高 1—2 米。茎上部有棱，薄被紧贴柔毛。羽状复叶长达 25 厘米；叶柄长 2—2.5 厘米，叶轴上面平，有浅槽，被白色并间生棕色平贴丁字毛；托叶线状披针形，长 5—8 毫米，脱落；小叶 5—9 对，对生，卵状披针形，长 3—6 厘米，宽 1.5—2 厘米，先端渐尖，基部圆形或阔楔形，上面绿色，下面淡绿色，两面均薄被平贴短丁字毛，下面和中脉间生有棕色短丁字毛，中脉两面均显著隆起，侧脉 13—14 对，两面明显；小托叶针形，长约 1.5 毫米。总状花序长 7—13 厘米，花多而稠密；总花梗短于叶柄，与花序轴均被锈褐色平贴或半开展的柔毛；苞片披针形，长约 1.5 毫米；花梗与苞片等长，被棕褐色柔毛；花萼斜杯状，密被灰褐色或棕褐色短柔毛；长 1—2 毫米，萼齿三角形，极短；花冠白色微带红色或紫色，旗瓣卵状椭圆形，长 6.5—8 毫米，外面密被棕褐色绢丝状毛，翼瓣边缘有睫毛，与旗瓣等长，龙骨瓣长 7—7.5 毫米，外面上部密被与旗瓣相同的毛；花药长圆形，基部疏被毛；子房无毛。荚果劲直，近圆柱形，肿胀，长 2.5—4.5 厘米，径 5.5—6 毫米，被疏毛，种子间有缢缩，顶端有尖喙，内果皮有紫色斑点，有种子 10—12 粒；种子扁圆形，径约 2 毫米。花期 6—9 月，果期 10—11 月。

产台湾、广东、广西、云南（西双版纳）。生于旷地、塘边、山坡路旁及林下。越南、老挝、泰国、菲律宾、印度尼西亚的爪哇及马来半岛也有。

28. 深紫木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 线苞木蓝 (西藏植物志) 图版 82: 4



图版 82 1—3. 尖叶木蓝 *Indigofera Zollingeriana* Miq.: 1. 花枝; 2. 旗瓣; 3. 荚果。4—7. 深紫木蓝 *Indigofera atropurpurea* Buch.-Ham. ex Hoenem.: 4. 花枝; 5—6. 苞片; 7. 荚果。8—11. 光叶毛瓣木蓝 *Indigofera hebetata* Benth. ex Baker var. *glabra* Ali: 8. 花枝; 9. 小叶片; 10. 花蕾 (示苞片); 11. 荚果 (裂开示种子); 12—18. 苞叶木蓝 *Indigofera bracteata* Grah. ex Baker: 12. 花枝; 13. 小叶片和丁字毛; 14. 花萼; 15. 旗瓣; 16. 翼瓣; 17. 龙骨瓣; 18. 雄蕊和雌蕊。(何冬泉绘)