

Indigofera atropurpurea Buch.-Ham. ex Hornem. Hort. Reg. Bot. Hafn. Suppl. 152. 1819; Hook. in Curtius's Bot. Mag. 58: t. 3065. 1831; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 101. 1876, p. p.; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 156. 1886, p. p.; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 10: 75. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 548. 1933; 中国主要植物图说·豆科 257. 图 252. 1955; Ali in Bot. Not. 3: 571. 1958, et Fl. W. Pakistan 100: 84. 1977; Ohashi in Fl. E. Himal. 157. 1966, et Enum. Fl. Pl. Nepal. 2: 122. 1979; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 30: 246. 1970; de Kort et Thijse in Blumea 30: 110. 1984; 西藏植物志 2: 772. 图 249—9. 1985. — *I. atropurpurea* Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 57. 1814, nom. nud. et Fl. Ind. 3: 381. 1832. — *I. cavaleriei* Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 12: 190. 1913; Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 3: 117. 1914.

灌木或小乔木，高 1.5—5 米。茎褐色，有圆形皮孔，嫩枝绿色，有棱，被白色或间生棕色平贴丁字毛，老枝褐色，圆柱形，羽状复叶长达 24 厘米；叶柄长 2.5—3.5 (—5) 厘米，叶轴上面扁平或有浅槽，与小叶柄均被白色或间生有棕色平贴疏丁字毛；托叶披针状钻形，长 3—5 毫米，早落；小叶 3—9 (—10) 对，对生，膜质，卵形或椭圆形，稀近阔卵形，长 1.5—6.5 (—8) 厘米，宽 1—2.5 (—3.5) 厘米，先端圆钝，微凹或急尖，有小尖头，基部阔楔形或圆形，两面疏生短丁字毛，或上面近无毛，中脉上面凹入，下面隆起，侧脉 8—10 对，两面均明显；小叶柄长 1.5—2.5 毫米，小托叶钻形，与小叶柄近等长或较短。总状花序长达 28 厘米，通常长 8—15 厘米；总花梗长 1.5—2.5 厘米，与花序轴均被棕色疏丁字毛；苞片卵形或卵状披针形，长 2.5—3.5 (—5) 毫米，先端尾状渐尖，外面被棕色毛；花梗短，长约 1.5 毫米；花萼钟状，长 2.5 毫米，外面密被灰褐色丁字毛，萼齿短三角形，长约 0.5 毫米；花冠深紫色，旗瓣长圆状椭圆形，长 7—8.5 毫米，宽 4.5—5.5 毫米，外面无毛，翼瓣长 7—8 毫米，先端有缘毛，基部有短瓣柄，龙骨瓣长 7.5—8.5 毫米，先端及边缘有柔毛，中下部有距，距长约 0.5 毫米，基部有短瓣柄；花药球形，顶端有小凸尖头，基部有少量髯毛；子房无毛，有胚珠 6—9 粒，荚果圆柱形，长 2.5—5 厘米，两缝线明显加厚，早期疏被毛，后变无毛，有种子 6—9 粒。种子间有横隔，内果皮白色，无紫色斑点，果瓣开裂后旋卷状；果梗短，长约 1.5 毫米，下弯；种子赤褐色，近方形，长约 1.75 毫米，宽约 1.5 毫米。花期 5—9 月，果期 8—12 月。

产江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川（西南部）、贵州、云南（蒙自）及西藏（墨脱）等省区。生于山坡路旁灌丛中、山谷疏林中及路旁草坡和溪沟边，海拔 300—1600 米。越南、缅甸、尼泊尔、印度及克什米尔地区也有分布。

29. 毛瓣木蓝

Indigofera hebetata Benth. ex Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 101. 1876; Ali in Bot. Not. 3: 572. 1958; Ohashi in Fl. E. Himal. 3: 65. 1975.

29a. 毛瓣木蓝 (原变种)