

达4毫米，下弯。花期6月。

产四川、云南。生于湿润山坡、林中及松林下，海拔2100—3200米。模式标本采自四川木里。

42. 矮木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版86: 1—8

Indigofera sticta Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 61. 1913; 中国主要植物图说·豆科 225. 1955.


灌木或亚灌木，高约70厘米。茎单一或分枝；老枝栗褐色，具棱，幼枝禾秆色，有丁字毛。羽状复叶长4—9厘米；叶柄长3—3.5厘米，叶轴上面有槽，被毛；托叶线状披针形，长约3.5毫米，被毛，小叶1—2对，对生，椭圆形或阔椭圆形，长2.5—4厘米，宽1.7—2.8厘米，先端钝圆或微凹，基部圆形，两面有白色并间生棕色丁字毛，下面中脉及叶缘棕色丁字毛较密，中脉上面微凹入，侧脉5—6对，上面明显；小叶柄长约2.5毫米；小托叶微小。总状花序长5(—9)厘米；总花梗长1.3—1.7厘米，花序轴被毛；苞片卵形，长约1.5毫米，脱落；花梗长约2毫米；花萼长约3.5毫米，外面被绢丝状丁字毛，萼筒长1.5—2毫米，萼齿三角形，近等长，长约1.5毫米；花冠紫红色或紫色，旗瓣椭圆形或倒卵状椭圆形，长6.5(—8)毫米，宽3.5—4毫米，外面有毛，翼瓣长约6毫米，基部有耳，边缘有毛，龙骨瓣长约6.5毫米，先端有毛，距长约1毫米；花药卵球形，两端无毛；子房无毛。花期5月。

产云南(易门、蒙自)。生于沟边林下，海拔1800米。模式标本采自蒙自。

43. 川西木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版的86: 9—11

Indigofera dichroa Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 50. 1913, et in Sarg. Pl. Wils. 2: 100. 1914; 中国主要植物图说·豆科 237. 图 222. 1955.

直立灌木，高1—1.5米。枝禾秆色，初被白色并间生棕色平贴丁字毛，后变无毛，有棱，具光泽，节较明显，老枝黑褐色。羽状复叶长4—8厘米；叶柄长1.2—3.5厘米，叶轴上面有槽，与叶柄均被白色或间生棕色平贴丁字毛；托叶线形，长4—6毫米；小叶1—2对，对生，纸质，椭圆形、卵状椭圆形或椭圆状倒卵形，长1—4厘米，宽0.8—2.5厘米，先端钝圆或渐尖，具小尖头，基部楔形或圆形，上面绿色，被短而密的丁字毛，下面淡绿色，被长而密的丁字毛，中脉上面隆起，侧脉约6对，两面均明显；小叶柄长1.5—2毫米，被棕色毛；小托叶小，早落；总状花序长达6厘米，基部有宿存鳞片；总花梗长5—9毫米，与花序轴均密被白色柔毛；苞片卵形，长约1.5毫米，早落；花梗长约1.5毫米，被白色柔毛；花萼杯状，长3—3.5毫米，外面被白色柔毛，萼筒长约2毫米，萼齿三角状披针形，长1—1.5毫米；花冠淡红色，旗瓣椭圆状倒卵形，长8.5—11毫米，宽3—3.5毫米，先端圆钝，基部渐狭，外面有白色柔毛，翼瓣与旗瓣近等长，龙骨瓣稍长；花药卵球形，顶端有小凸尖，两端无毛；子房密被白色长硬毛，花柱及柱头无毛。荚果淡黄褐色，线状圆柱形，长达4.5厘米，被白色或间生棕色丁字毛，内果皮无斑点；果梗平展；种子近方形。花期5—6月，果期7—8月。



图版 86 1—8. 矮木蓝 *Indigofera sticta* Craib: 1. 花枝; 2. 丁字毛; 3. 花萼; 4. 旗瓣;
5. 翼瓣; 6. 龙骨瓣; 7. 花药; 8. 雌蕊。9—11. 川西木蓝 *Indigofera dichroa* Craib: 9.
果枝; 10. 茎一段 (示托叶); 11. 花。(何冬泉绘)