

米，有丁字毛；花冠紫红色，旗瓣阔倒卵形，长约6毫米，宽约4毫米，外面有平贴丁字毛，翼瓣与龙骨瓣近等长，长约5.5毫米，龙骨瓣有距；花药球形，顶端有小凸尖；子房线形，有毛。荚果线状圆柱形，长2.5—3.5厘米，内果皮有斑点，果梗下弯；种子赤褐色，椭圆形，长约2毫米。花期5—8月，果期10—11月。

产陕西、甘肃。生于山坡路旁、丘陵灌丛及疏林中，海拔800—1600米。

68. 多花木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版92: 13—17

*Indigofera amblyantha* Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 47. 1913; et Sarg. Pl. Wils. 2: 99. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 161. 1926; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 3: 421. 1936; Peter-Stib. in Act. Hort. Gothob. 13: 421. 1939; 中国主要植物图说·豆科 257. 图 250. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 389. 图 2508. 1972; 秦岭植物志 1(3): 34. 1981; Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 170. 1989.


直立灌木，高0.8—2米；少分枝。茎褐色或淡褐色，圆柱形，幼枝禾秆色，具棱，密被白色平贴丁字毛，后变无毛。羽状复叶长达18厘米；叶柄长2—5厘米，叶轴上面具浅槽，与叶柄均被平贴丁字毛；托叶微小，三角状披针形，长约1.5毫米；小叶3—4（—5）对，对生，稀互生，形状、大小变异较大，通常为卵状长圆形、长圆状椭圆形、椭圆形或近圆形，长1—3.7（—6.5）厘米，宽1—2（—3）厘米，先端圆钝，具小尖头，基部楔形或阔楔形，上面绿色，疏生丁字毛，下面苍白色，被毛较密，中脉上面微凹，下面隆起，侧脉4—6对，上面隐约可见；小叶柄长约1.5毫米，被毛；小托叶微小。总状花序腋生，长达11（—15）厘米，近无总花梗；苞片线形，长约2毫米，早落；花梗长约1.5毫米；花萼长约3.5毫米，被白色平贴丁字毛，萼筒长约1.5毫米，最下萼齿长约2毫米，两侧萼齿长约1.5毫米，上方萼齿长约1毫米；花冠淡红色，旗瓣倒阔卵形，长6—6.5毫米，先端螺壳状，瓣柄短，外面被毛，翼瓣长约7毫米，龙骨瓣较翼瓣短，距长约1毫米；花药球形，顶端具小突尖；子房线形，被毛，有胚珠17—18粒。荚棕褐色，线状圆柱形，长3.5—6（—7）厘米，被短丁字毛，种子间有横隔，内果皮无斑点；种子褐色，长圆形，长约2.5毫米。花期5—7月，果期9—11月。

产山西、陕西、甘肃、河南、河北、安徽、江苏、浙江、湖南、湖北、贵州、四川。生于山坡草地、沟边、路旁灌丛中及林缘，海拔600—1600米。模式标本采自湖北西部。

全草入药，有清热解毒、消肿止痛之效。

69. 刺序木蓝 (植物分类学报) 席氏木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版93: 4—5

*Indigofera silvestrii* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. 17: 397. 1910; Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 68. 1913; 中国主要植物图说·豆科 247. 图 237. 1955; Ali. in Bot. Not. 3: 567. 1958; Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin.



图版 92 1—8. 马棘 *Indigofera pseudotinctoria* Matsum.: 1. 花枝; 2. 茎一段 (放大示棱); 3. 小叶片 (示毛); 4. 花萼; 5. 旗瓣; 6. 翼瓣; 7. 龙骨瓣; 8. 荚果。9—12. 河北木蓝 *Indigofera bungeana* Walp.: 9. 果枝; 10. 茎一段; 11. 花萼; 12. 荚果。13—17. 多花木蓝 *Indigofera amblyantha* Craib: 13. 花枝; 14. 茎一段 (放大示棱); 15. 小叶片 (示毛); 16. 花萼; 17. 荚果。(何冬泉绘)