

本亚组模式种: *Indigofera hirsuta* Linn.

我国有 1 种。

71. 硬毛木蓝 (植物分类学报) 刚毛木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版 94: 1—4

*Indigofera hirsuta* Linn. Sp. Pl. 753. 1753; DC. Prodr. 2: 228. 1825; Roxb. Fl. Ind. 3: 276. 1832; Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 305. 1855; Benth. Fl. Hongk. 76. 1861; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 98. 1876; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 157. 1886; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. ser. 9: 75. 1912; Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 64. 1913; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 429. 1916; 中国主要植物图说·豆科 227. 图 208. 1955; Merr. et Chun in Sunyatsenia 4: 82. 1940; Ali. in Bot. Not. 3: 559. 1958; Gillett in Kew Bull. Add. ser. 1: 109. 1958; et Kew Bull. 14: 290. 1960; 海南植物志 2: 256. 1965; 台湾植物志 3: 302. 图 591. 1977; Verdc. Man. New Guinea Leg. 351. 1979; de Kort. et Thijse in Blumea 30: 120. 1984; Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 170. 1989.

平卧或直立亚灌木, 高 30—100 厘米; 多分枝。茎圆柱形, 枝、叶柄和花序均被开展长硬毛。羽状复叶长 2.5—10 厘米; 叶柄长约 1 厘米, 叶轴上面有槽, 有灰褐色开展毛; 小叶 3—5 对, 对生, 纸质, 倒卵形或长圆形, 长 3—3.5 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端圆钝, 基部阔楔形, 两面有伏贴毛, 下面较密, 侧脉 4—6 对, 不显著; 小叶柄长约 2 毫米。总状花序长 10—25 厘米, 密被锈色和白色混生的硬毛, 花小, 密集; 总花梗较叶柄长; 苞片线形, 长约 4 毫米; 花梗长约 1 毫米; 花萼长约 4 毫米, 外面有红褐色开展长硬毛, 萼齿线形; 花冠红色, 长 4—5 毫米, 外面有柔毛, 旗瓣倒卵状椭圆形, 有瓣柄, 翼瓣与龙骨瓣等长, 有瓣柄, 距短小; 花药卵球形, 顶端有红色尖头; 子房有淡黄棕色长粗毛, 花柱无毛。荚果线状圆柱形, 长 1.5—2 厘米, 径 2.5—8 毫米, 有开展长硬毛, 紧挤, 有种子 6—8 粒, 内果皮有黑色斑点; 果梗下弯。花期 7—9 月。果期 10—12 月。

产浙江、福建、台湾、湖南、广东、广西及云南 (河口)。生于低海拔的山坡旷野、路旁、河边草地及海滨沙地上。热带非洲、亚洲、美洲及大洋洲也有分布。


亚组 11. 腺毛木蓝亚组 Subsect. Scabridae Y. Y. Fang et C. Z. Zheng in Act. Phytotax. Sin. 27: 167. 1989.

本亚组模式种: *Indigofera scabrida* Dunn

我国有 3 种。

72. 腺毛木蓝 (中国主要植物图说·豆科) 图版 95: 1—5

*Indigofera scabrida* Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 35: 487. 1903; Craib in Not. Bot. Gard. Edinb. 8: 64. 1913, et in Sarg. Pl. Wils. 2: 101. 1914; Hand—



图版 94 硬毛木蓝 *Indigofera hirsuta* Linn.: 1. 果枝; 2. 苞片; 3. 花萼 (展开背面观); 4. 雌蕊。(何冬泉绘)