

产福建、广东、海南、广西及云南等省区。生于平原、丘陵荒地或山坡草地、疏林或灌丛中，海拔 40—1 100 米。泰国、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚也有分布。

根、叶供药用，有消炎解毒、活血利尿之效。

本种与排钱树相近，但主要区别在排钱草叶上面和叶状苞片近无毛，或叶状苞片略被短柔毛；荚果常具 2 节，熟时无毛或略被柔毛。

28. 两节豆属 *Dicerma* DC.

DC. Prodr. 2: 339. 1825; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 483. 1964. —
Desmodium sect. *Dicerma* (DC.) Benth. in Benth. et Hook. f.
 Gen. Pl. 1: 519. 1865. — *Desmodium* subgen. *Dicerma* (DC.)
 Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 163. 1876.

亚灌木或灌木。叶为指状复叶，小叶 3；有托叶和小托叶，托叶联合抱茎，先端多为 3 裂，小托叶极小。总状花序顶生或腋生；有苞片和小苞片，苞片狭三角形，小苞片着生于花萼的基部；花 2—5 朵簇生于每一节上；花萼钟状或漏斗状，外面被贴伏长毛和小钩状毛，5 裂，上部 2 裂片合生为 1 而成 4 裂状或先端稍 2 裂，下部裂片与其他裂片等长或较长；花冠红色，旗瓣狭倒卵形至倒卵形，无耳，翼瓣窄长圆形，具瓣柄，龙骨瓣长椭圆形，较翼瓣短，具耳和瓣柄；雄蕊二体 (9+1)；雌蕊无柄；子房被毛，具 2 胚珠。荚果有 2 荚节，腹背两缝线均于种子之间深缢缩，被丝状毛，偶有 1 荚节；种子具带边假种皮。

属模式种：两节豆 *Dicerma biarticulatum* (Linn.) DC.

仅 1 种，分布于亚洲东南部至澳大利亚北部。

本属与山蚂蝗属极近似，唯其叶具指状 3 小叶，托叶先端多为 3 裂，裂片刺芒状；荚果小，通常具 2 荚节，腹背缝线深缢缩呈圆齿状，荚节近圆形；花粉粒主要具三孔槽，不等极，外壁具粗糙网纹，壁厚。有些学者主张将它归并于山蚂蝗属内，我们认为有分立的價值。

1. 两节豆 (海南植物志) 红退气 (海南崖县) 图版 1: 5—7

Dicerma biarticulatum (Linn.) DC. Prodr. 2: 339. 1825; Benth. in Miq. Pl. Jungh. 217 et 219. 1852; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 20: 267. 1924; Ohashi in Ginkgoana 1: 252. 1973. — *Hedysarum biarticulatum* Linn. Sp. Pl. 1054. 1753. — *Echinolobium biarticulatum* (Linn.) Desv. in Mem. Soc. Linn. Paris 4: 310. 1825. — *Desmodium biarticulatum* (Linn.) F.-Muell. Fragm. Phyt. Austr. 2: 121. 1861; 海南植物志 2: 273. 1965. — *Aphyllodium biarticulatum* Gagnep. in Lecomte Not. Syst. 3: 254. 1916.

亚灌木，高 40—70 厘米。茎直立或平卧，纤细，幼时被贴伏柔毛。叶为指状复叶，